

கம்பு

பயிர்மேம்பாடு

I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

1.	மாவட்டங்கள் / பருவம் இறவை சித்திரைப்பட்டம் (மார்ச்-ஏப்ரல்) (நீலகிரி தவிர அனைத்துக் கம்பு பயிரிடும் மாவட்டங்கள்) மாசிப்பட்டம் (ஐனாவரி-பிப்ரவரி) (நீலகிரி தவிர அனைத்துக் கம்பு பயிரிடும் மாவட்டங்கள்)	இரக வீரிய ஒட்டு இரகங்கள் கோ 7, கோ(சிய) 9, எக்ஸ் 7, ஐசிஎம்வி 221 கோ 7, கோ(சிய) 9, எக்ஸ் 7, ஐசிஎம்வி 221
2.	மானாவாரி ஆடிப்பட்டம் (ஐன்-ஐலை) புரட்டாசிப்பட்டம் (செப்டம்பர்- அக்டோபர்)	கோ 7, கோ(சிய) 9, எக்ஸ் 7, ஐசிஎம்வி 221 கோ 7, கோ(சிய) 9, எக்ஸ் 7, ஐசிஎம்வி 221

கம்பு வீரிய ஒட்டு இரகம் மற்றும் இரகங்கள் பற்றிய விவரம்

விவரம்	கோ 7	எக்ஸ் 7	கோ(சிய) 9	ஐசிஎம்வி 221
பெற்றோர்	(கோ 6 x பிகே 560) பிடி1921	எல் 111 ஏ x பிடி 1890	ஐசிஎம் 93752இல் இடும்து தேர்வு	--
பருவம் இறவை / மானாவாரி	இரண்டும்	இரண்டும்	இரண்டும்	இரண்டும்
வயது (நாட்கள்)	90 100	90	80 85	75 80
தானிய மகசூல் (கிலோ /எக்டர்)				
மானாவாரி	2500-2800	2513	2354	13% >ICTP 8203
இறவை	3000-3500	3295	2865	--
செடியின் உயரம் (செ.மீ.)	130-145	155-180	186-222	140-200
தூர்களின் எண்ணிக்கை	6-10	4-7	3-6	அதிக தூர்கள்
தண்டின் நிறம்	பச்சை	இல்லை	--	--
உரோமங்கள் 50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	லேசாக உள்ளது 65-70	லேசாக உள்ளது 50-55	லேசாக உள்ளது 50-55	இல்லை 50-55
கதிரின் தோற்றம்	கூண்டு/உருளை ஸ்பின்டில் வடிவம்	மெழுகுவார்த்தி வடிவம்	மெழுகுவார்த்தி/ உருளை வடிவம்	பாதி கட்டுமான கதிர்கள்
கதிரில் உரோமங்கள்	இல்லை		இல்லை	இல்லை
கதிரின் நீளம் (செ.மீ.)	22-26	25-35	33-39	--
கதிரின் அகலம் (செ.மீ.) தானிய நிறம்	3-4 இளம் சாம்பல்	-- சாம்பல்	8-10 சாம்பல் நிறம் மற்றும் மஞ்சள் அடிப்பாகம்	-- அழுத்தமான சாம்பல் நிறம்
1000 தானியங்களின் எடை (கிராம்)	6.8-7.2	8.0-9.0	9.0-11.0	10.0-15.0
சிறப்பு குணங்கள்	அடிச்சாம்பல் நோய் எதிர்ப்புத்திறன்	அடிச்சாம்பல் நோய் எதிர்ப்புத்திறன்	அடிச்சாம்பல் நோய் எதிர்ப்புத்திறன்	அடிச்சாம்பல் நோய் எதிர்ப்புத்திறன்