

# கேழ்வரகு

பயிர்மேம்பாடு

## I. பருவம் மற்றும் இரகங்கள்

மாவட்டங்கள் / பருவம்	இரகங்கள்
<b>இறவை</b> மார்கழிப்பட்டம் (டிசம்பர்-ஜனவரி) (கன்னியாகுமரி, நீலகிரி தவிர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம்) சித்திரைப்பட்டம் (ஏப்ரல்-மே) (கன்னியாகுமரி, நீலகிரி தவிர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம்)	கோ 9, கோ 13 மற்றும் கோ (இரா) 14  கோ 9, கோ 13 மற்றும் கோ (இரா) 14
<b>மானாவாரி</b> ஆடிப்பட்டம் (ஜூன்-ஜூலை) (கன்னியாகுமரி, நீலகிரி தவிர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம்) புரட்டாசிப்பட்டம் (கன்னியாகுமரி, நீலகிரி தவிர அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சாகுபடி செய்யலாம்)	பையூர் 1, கோ 13, கோ(இரா) 14, திருச்சி 1  பையூர் 1, கோ 13, கோ(இரா) 14

## கேழ்வரகு இரகங்களின் விபரங்கள்

விபரம்	கோ 9	கோ 13	கோ (இரா) 14
பெற்றோர்	இளகல் 4336 x பிளஸ் ஆர் 1	கோ 7 x டிஎன்எச் 107	மாலவி 1305 x கோ 13
வயது (நாட்கள்)	100-105	95-100	105-100
<b>பருவம்</b> இறவை / மானாவாரி	இரண்டும்	இரண்டும்	இரண்டும்
<b>தானிய மகசூல் (கிலோ/ எக்டர்)</b>			
இறவை	4500	3600	2892
மானாவாரி	3100	2300	2794
<b>தட்டை மகசூல் (கிலோ/ எக்டர்)</b>			
இறவை	8000	10000	8113
மானாவாரி	6500	7500	8503
தண்டு	நேரானது	--	நேரானது
உயரம் (செ.மீ.)	75-80	85-90	115-120
தூர்களின் எண்ணிக்கை	5-8	3-5	8-9
50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	65-70	55-60	72
கதிர்வடிவம்	உள்வளைந்த விரல்கள்	திறந்தது.	நுனி வளைந்தது
விரல்களின் எண்ணிக்கை	8-9	10-17	9-12
கதிரின் நீளம் (செ.மீ.)	8	8-10	10-12
தானியத்தின் நிறம்	வெள்ளை	லேசான பழுப்பு	பழுப்பு
1000 தானியங்களின் எடை (கிராம்)	2.7	1.7	3.1

விபரம்	பையூர் 1	திருச்சி 1
பெற்றோர்	தனிவழித்தேர்வு பி.ஆர் 722	தனிவழித்தேர்வு எச்.ஆர் 374
வயது (நாட்கள்)	115-120	102
<b>பருவம்</b> இறவை / மானாவாரி	இரண்டும்	இறவை உவர் மற்றும் களர் மண்ணிற்கு ஏற்றது.
<b>தானிய மகசூல் (கிலோ/ எக்டர்)</b>		
இறவை	--	4011
மானாவாரி	3125	--
<b>தட்டை மகசூல் (கிலோ/ எக்டர்)</b>		
இறவை	--	6800

மானாவாரி	5750	--
தண்டு	நேரானது	நேரானது
உயரம் (செ.மீ.)	110	100
தூர்களின் எண்ணிக்கை	1-3	5-7
50 சதம் பூக்கும் நாட்கள்	80	78
கதிர்வடிவம்	திறந்த வடிவம்	உள்வளைந்தது
விரல்களின் எண்ணிக்கை	6-8	5-8
கதிரின் நீளம் (செ.மீ.)	8	7.6
தானியத்தின் நிறம்	பழுப்பு	பழுப்பு
1000 தானியங்களின் எடை (கிராம்)	2.7	2.74