

## எள்

**பருவம் மற்றும் இரகங்கள்**  
**மாவட்டம் / பருவம் மற்றும் இரகங்கள்**

அ. மானாவாரி :			
1.	ஆடிப்பட்டம் (ஜீன்-ஜீலை) அனைத்து மாவட்டங்களிலும்	:	கோ 1, டி.எம்.வி.3.
2.	கார்த்திகைப்பட்டம் (அக்டோபர்-நவம்பர்) அனைத்து மாவட்டங்களிலும்	:	கோ 1, டி.எம்.வி.3, டி.எம்.வி.5, எஸ்.வி.பி.ஆர் 1.
<b>ஆ. இறவை :</b>			
1.	மாசிப்பட்டம் (பிப்ரவரி-மார்ச்) கோயம்புத்தூர், சரோடு, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், கரூர், மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம்.	:	டி.எம்.வி.3, டி.எம்.வி.4, டி.எம்.வி.6, கோ 1, வி.ஆர்.ஐ (எஸ்.வி) 1, எஸ்.வி.பி.ஆர்.1.
2.	நெல் தரிக		
	கூடுகரையோரப் பகுதிகள்	:	வி.ஆர்.ஐ (எஸ்.வி) 1

## எள் இரகங்கள்

பண்புகள்	கோ 1	டி.எம்.வி. 3	டி.எம்.வி. 4	டி.எம்.வி. 5
பெற்றோர்	(டி.எம்.வி. 3 x எஸ்.ஐ. 1878) x எஸ்.ஐ. 1878)	தென் ஆற்காடு உள்ளூர் இரகம் x மலபார்	சாத்தூர் உள்ளூர் இரகத்தில் இருந்து தனிவழித் தேர்வு	முனைக்குண்டம் இரகத்தில் இருந்து தனிவழித் தேர்வு
வயது (நாள்)	85-90	80-85	85-90	80-85
எண்ணெய் சத்து (%)	51	51	50	51
விளைச்சல் கி /ஹெ இறவை	750 790	625 750	700 850	
மானாவாரி	450-650	400-650	-	450-650
செடி அமைப்பு	மையத்தண்டு நீண்ட கிளைகளையும், குறைந்த கணு விடைப் பகுதிகளையும் கொண்டது	நன்கு கிளைத்த புதர் செடி போன்ற தோற்றத்தை உடையது.	நன்கு கிளைத்த புதர் செடி போன்றது	நேரான, நடுத்தரமான கிளைகளை கொண்டது.
காய்கள்	4 அறைகள்	4 அறைகள்	4 அறைகள்	4 அறைகள்
விதைகள்	கருப்பு	கரும்பழுப்பு	பழுப்பு	பழுப்பு

  

பண்புகள்	டி.எம்.வி. 6	எஸ்.வி.பி.ஆர்.1	வி.ஆர்.ஐ(எஸ்.வி) 1
பெற்றோர்	ஆந்திரபிரதேச இரகத்திலிருந்து தனிவழித் தேர்வு	மேற்கு மலைத்தொடர் வெள்ளை இரகத் தேர்வு	திருத்தாட்டுப்பள்ளி இரகத்திலிருந்து தனிவழித் தேர்வு

வயது (நாள்)	85-90	75-80	70-75
விளைச்சல் கி /ஹெ இறவை	700-950	800	650-900
மானாவாரி	-	600	450-650
எண்ணெய் சத்து (%)	54	53.8	51
செடி அமைப்பு	நேரானது மற்றும் நடுத்தர கிளைகளை உடையது	நேரானது மற்றும் நடுத்தர கிளைகளை உடையது	நடுத்தர கிளைகளை உடையது
காய்கள்	4 அறைகள்	4 அறைகள்	4 அறைகள்
விதைகள்	பழுப்பு	வெள்ளை	பழுப்பு