



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	23.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	56	49	49	49	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	10	10	9	8	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	82	70	82	87	86
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	5	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 49%), 32.0°C மற்றும் 22°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	68	68	68	70	70
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	69	69	69	71	70
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	51	49	49	49	48
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	73	70	73	82	79
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	70	70	70	70	70
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	47	47	47	47
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	9	9	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	81	80	81	95	88
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	5	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 47%), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா
இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசுறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	48	48	48	48	47
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	10	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	76	75	76	87	82
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 47 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	49
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	66	66	66	70	69
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	46	46	46	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	9	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	78	77	78	90	86
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	5	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 46 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	69	69	69	70	70
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

கிருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொட்டியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	47	47	47	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	9	9	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	82	81	82	97	89
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	5	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	49	48	48	48	48
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	12	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	67	67	67	74	72
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 11 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துத் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	30.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	21.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	47	47	47	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	9	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	73	72	73	83	80
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	2	1	6	5	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 50 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 19-01-2024

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2024-01-19 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	32.0	32.0	31.0	31.0	31.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	22.0	21.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	52	49	49	49	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11	11	9	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	78	71	78	86	83
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	5	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (90.0% & 49 %), 31.0°C மற்றும் 21°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். வடகிழக்கு திசையில் காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் தமிழகத்தின் சராசரி மழைப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருக்கும்

குறுஞ்செய்தி :

வானிலை முன்னறிவிப்பு மற்றும் அதற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனைகளை தெரிந்து கொள்ள மேக்தூட் கைபேசி செயலியினை

பயன்படுத்தவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் (ஜோவார் / சோளம்)	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/ ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	தைப்பட்டம் (ஜனவரி - பிப்ரவரி) இடையில் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் மக்காச்சோளத்தினை விதைக்கும் முன் இமிடாகுளோபிரிட் 70 WS மருந்தினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தி விதை நேர்த்தி செய்து பின் விதைக்கவும். மக்காச்சோள மேக்சிம் பூஸ்டரினை மக்காச்சோள பயிருக்கு ஏக்கருக்கு 3 கிலோ என 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஆண் மஞ்சரி மற்றும் மணி உருவாகும் பருவத்தில் தெளிக்கவும். கூடுதலாக ஒட்டும் திரவம் சேர்த்து கொள்ளவும். பயன்கள்: மணி பிடிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை கூடும் மற்றும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	பொதுவாக மழைக்காலம் முடிந்து டிசம்பர், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களில் மாட்டு பண்ணையில் ஹெமட்டோட்டியா ஈ அதிகமாக காணப்படும். இது கடிக்கும் ஈ வகையாகும் இந்த ஈக்களை கட்டுப்படுத்த கொட்டகை அடிக்கடி சுத்தம் செய்து சாணத்தை அகற்றி குப்பை குழிகளில் போட வேண்டும். ஈக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பட்சத்தில் மாட்டின் மீது வேப்ப எண்ணெய் தடவி கட்டுப்படுத்தலாம்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	மழை காலத்தில், கோழி தீவனத்தில் மற்றும் ஆழ் கூளத்தில் ஈரப்பதம் அதிகம் காணப்படுவதால் கிளாஸ்டிரிடியம், ஈகோலை மற்றும் இரத்தக்கழிச்ச்ச்சலை உண்டாக்கும் காக்சீடியா கிருமிகள் வளர உகந்த சூழ்நிலை உள்ளதால் தரமான தீவன மூலப்பொருட்களை விவசாயிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். இச்சமயத்தில் கோழிகளுக்கு கருவாடு, மீன், கோதுமை போன்ற தீவன பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தவிர நாட்டுக்கோழிகளுக்கு குடற்புழு நீக்கம் செய்ய வேண்டும். தீவனத்தை பரிசோதித்த பின் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. அதே போல் ஆழ் கூளத்தை அதிக ஈரப்பதம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.