



**இந்திய வானிலைத் துறை & தமிழ்நாடு வேளாண் மையப் பல்கலை கழகம்**

வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம், கோவை – 641 003.

மண்டல வாரியான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை –  
05.05.2021



**மாநிலத்தின் கடந்த வார வானிலை**

தமிழகத்தின் பெரும்பாலானபகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை  $34^{\circ}$ செ முதல்  $40^{\circ}$ செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை  $24^{\circ}$ செ முதல்  $29^{\circ}$ செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை  $18^{\circ}$ செ முதல்  $24^{\circ}$ செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை  $10^{\circ}$ செ முதல்  $12^{\circ}$ செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

**1. மேற்கு மண்டலம்**

மேற்கு மண்டலப் பகுதிக்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களான கோயமுத்தூர், ஈரோடு மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய இடங்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். ஆங்காங்கே இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $36^{\circ}$ செ முதல்  $37^{\circ}$ செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $25^{\circ}$ செ முதல்  $26^{\circ}$ செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 68 முதல் 72 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 முதல் 42 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 முதல் 10 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையில் வீசுக்கூடும்.

**வேளாண் அறிவுரை**

- மேற்கு மலைத்தொடர்ச்சி மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது. நீர்பாசனத்தை தள்ளிப்போடவும் மற்றும் கோடை உழவு செய்யவும்.
- இலோசான தூறலே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மண்ணின் ஈரத்தை பொறுத்து இறவை பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சவும்.
- இலோசானதூறல் மழையே எதிர்பார்க்கப்படுவதால், உழுத நிலங்களில் இறவை சோளம் விடைத்து தொடர்ந்து நீர் பாசனம் செய்யவும்.
- இறவை கம்பு விடைத்தல் மற்றும் மற்றும் பாடுவாசியை தொடரவும். விடைகளை 2 சதவீதம் பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசல் கொண்டு கடினப்படுத்தி (விடைகளை 16 மணி நேரம் ஊரவைத்து, 5 மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி) விடைக்கவும்.
- பொள்ளாச்சி வட்டத்தில் மானாவாரி சித்திரைப்பட்ட நிலக்கடலை நடவு செய்ய இதுவே உகந்த தருணமாகும். மேலும் மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விடைப்பதற்கு நிலம் தயார் செய்து விடைப்பு செய்யவும்.
- தற்போது நிலவும் அதிக பகல்நேர மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் 15 -ம் தேதி கோடையில் இறவை எள் பயிரில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் தாக்கம் தென்படுகிறது. இதனை கண்காணித்து மாலை நேரங்களில் 5 சதம் வேப்பம் கொட்டை வடிகரைசலை தெளிக்கவும்.

- சில பகுதிகளில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் காய்கறிகளில் சிலந்தி தாக்குதல் வர வாய்ப்புள்ளது. ஆதலால் விவசாயிகள் வயலை நன்கு கண்காணித்து தாக்குதல் தென்பட்டால் கைகோபால் 2.5 மிலி அல்லது நண்யும் கந்தநகம் 3.5 கி ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
  - மழையுடன் காற்றின் வேகம் அதிகமாக எதிர்பார்க்கப்படுவதால் கரும்பு பயிர் சாயாமல் தவிர்க்க தோகை உரிக்க வேண்டும்.
  - தற்போது நிலவும் அதிக பகல்நேர மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை காரணமாக நடவு செய்த கரும்புக்கு அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சுவதன் மூலம் முளைப்புத்திறனை அதிகப்படுத்தலாம்.
  - தென்னை மரத்தின் பாத்திகளை களைக் கொத்து கொண்டு கிளறி விடுவதன் மூலம் மழை நீரை சேகரிக்கலாம்.
  - இலோசான தூறலே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மண்ணின் ஈரத்தை பொறுத்து இறவை பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுவும் குறிப்பாக தென்னை, வாழை போன்ற பயிர்களுக்கு நீர் பாய்ச்சுவும்.
  - நிலவும் வானிலையில் மஞ்சள் பயிரிடுவதற்கு நிலம் தயாரித்து விடைப்பு செய்யலாம்.
  - தற்போது நிலவும் பருவ நிலை உகந்ததாக இருப்பதால் திராட்சையில் கவாத்து செய்யவும்.
  - கோடையில் கிணறு மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணற்றிவிருந்து எடுக்கப்படும் நீரின் உப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த உப்புத்தண்ணீரை வயலுக்கு பாய்ச்சும் பொழுது பயிர்களில் குறிப்பாக மரவள்ளி கிழங்கில் அடி இலைகள் அதிக உப்பின் காரணமாக பழுப்பு நிறமாக மாறி காய்ந்துவிடும். இதற்கு கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள மேலாண்மை உக்திகளை கடைபிடித்து தாக்குதலின் தண்மையை குறைக்கலாம்.
1. அடிக்கடி நீர் பாய்ச்சி வயலை ஈரமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் உப்பு மேலே வராமல் தடுக்கவும்.
  2. காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர் பாசனம் செய்யவும்.
  3. நல்ல தண்ணீரை காலை, மாலை வேளைகளில் இலைகளின் மேல் தெளிக்கவும்.
  4. தொழு உரங்களை இடுவதன் மூலம் உப்பின் தாக்குதலை குறைக்கலாம்.
  5. நல்ல தண்ணீர் கிடைத்தால் தனியாக அல்லது உப்புத் தண்ணீருடன் கலந்து நீர் பசானம் செய்யவும்.
- வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுவதால் காளான் குடில்களில் வெப்பநிலையைக் குறைக்க சூடாரத்தின் மேல் தண்ணீர் தெளிப்பதன் மூலம் உற்பத்தியை அதிகரிக்கலாம்.
  - அதிக வெப்பநிலை நிலவு வாய்ப்புள்ளதால், கால்நடைகளை பகல் 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம்.
  - காற்றின் வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதால் கால்நடை குடில்களுக்குள் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி பால் உற்பத்தியை பராமரிக்கவும்.
  - அதிக வெப்பநிலை நிலவு வாய்ப்புள்ளதால், மழையில்லாத இடங்களில் கால்நடை மற்றும் கோழிக் குடில்களைச்சுற்றி நனைத்த சாக்கினை தொங்கவிடவும்.

## 2.காவிரி டெல்டா மண்டலம்

காவேரி பாசன பகுதிக்கு உப்பட்ட மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாலூர், கரூர், பெரம்பலூர், அரியலூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய இடங்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேகழுட்டத்துடன் காணப்படும். வரும் நாட்களுக்கு இலோசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகல்நேர வெப்பநிலையானது  $36^{\circ}\text{C}$  முதல்  $40^{\circ}\text{C}$  ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை  $27^{\circ}\text{C}$  முதல்  $28^{\circ}\text{C}$  ஆகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 45 சதவீகத்துமாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் 8 முதல் 10 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

## வேளாண் அறிவுரை

- தற்போது நிலவுக்கூடிய வானிலையால் விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் உள்ள உள்ந்து

- வரும் தினங்களில் உருந்து மற்றும் பாசிப்பயறு செடிகளை நன்கு வெயிலில் காயவைத்து பின்பு பயறுகளைப் பிரித்தெடுத்து சுத்தம் செய்து பின்பு ஈரப்பதம் 9 சதவீதத்திற்கும் குறையும் வரை நன்கு உலர்த்தி சேமிக்கவும்.
  
- தற்போது நிலவுக்கூடிய வானிலையால் என் பயிரில் தென்படும் பாக்டீரியா இலைக்கருகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு ஸ்ட்ரெப்டோசைக்ளின் 500 பிபிம் மருந்தினை 120 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
- எதிர்வரும் கோடை இறைவை பருவத்தில் சாகுபடி செய்ய ஆடுதுறை 5 ஏற்ற இரகமாகும்.
- தற்போது நிலவுக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படும் வாய்புள்ளதால் இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு மேங்கோசெப் 2 கிலோ என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என்பதால் கொட்டகையின் மேற்கூரையின் மீது தென்னாங்கீற்று அல்லது வைக்கோல் பரப்பி அதன் மீது தண்ணீர் தெளிப்பதன் மூலம் வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்கலாம்.

### 3. தெற்கு மண்டலம் - 1

தெற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.. வரும் நாட்களுக்கு இலேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை  $36-38^{\circ}$  செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை  $26-27^{\circ}$  செ ஆகவும், காலை மற்றும் மாலை நேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 80 முதல் 60 சதவிகிதமாகவும் பதிவாகவாய்ப்புள்ளது. 24 மணி நேர காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 முதல் 15 கி.மீ வரை இருக்கும் என்றும் காற்றின் திசை மேற்கு மற்றும் தெற்கு திசையில் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

- தற்போது நிலவும் வானிலையில் மண் ஈரத்தினைப் பொறுத்து பயிருக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் மானாவாரி சாகுபடி பயிர்களுக்கு மண்ணின் தரத்தை மேம்படுத்த அறுவடை செய்யப்பட்ட பயிர் கழிவுகளை துண்டுகளாக வெட்டி மண்ணில் கலக்கவும்.
- நிலவும் வானிலையால் நெல்லில் இலைக்கருட்டுப்புழு தென்படுகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு அசாடிராக்டின்  $0.03\%$  1000 மி.லி அல்லது குளோரோடேரேனிலிபுருள்  $18.5\% \text{ SC}$  @150கி அல்லது குளோரோடேரேனிலிபுருள்  $25\% \text{ WG}$  @150கி என்ற அளவில் தெளித்துக் கட்டுப்படுத்தவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையில் வெள்ளரி பழத்தில் தென்படும் ஈயைக் கட்டுப்படுத்த தாக்குதலுக்குள்ளான பழங்களை சேகரித்து அழித்து விட வேண்டும் மற்றும் பழ ஈ பொறி ஒரு ஏக்கருக்கு நான்கு வைக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் உருந்து வளர் பருவத்தில் மண்ணில் இருந்து அதிக நீர் ஆவியாகாமல் தடுக்க பயிர் கழிவு மூடக்கு பயன்படுத்தவும்.
- நிலவும் வானிலையில் கொய்யாச் செடியில் தேயிலை கொசு தென்படுகிறது. பூக்கும் தருணத்தில் மாலதியோன் 2மி.லி/லிட்டர் (அல்லது) 3% வேப்பண்ணைய் 3 வார இடைவெளியில் 4 முறை தெளிக்கவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் எலுமிச்சையில் சொறி நோய் தென்படுகிறது. இதைக்கட்டுப்படுத்த காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 2.5 கிராம் /லிட்டர் தண்ணீரில் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

## தெற்கு மண்டலம் -2

வரும் நாட்களில் மதுரை, சிவகங்கை, தேனி, புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், இராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் வானம் பெரும்பாலும் மேகழுட்டத்துடன் காணப்படும். இலேசானது மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகல்நேர வெப்பநிலையானது 37°செ முதல் 38°செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலையானது 26°செ ஆகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 75 மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 முதல் 50 சதவிகிதமாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றின் வேகம் 8 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

### வேளாண் அறிவுரை

- தற்போது நிலவும் வானிலையால் எலுமிச்சை செடியில் காய்பிடித்தல் அதிகமாவதற்கு 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 மில்லி என்ற அளவில் இசாபியான் மருந்து அல்லது 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் அமினோஅமிலத்தை கலந்து பூக்கும் தருணத்தில் தெளிக்கவும். காய்கள் உதிராமல் இருக்க என்.எ.ஏ (நாப்தலின் அசிடிக் ஆசிட்) வினை 30 பி.பி.எம் என்ற அளவில் கலந்து காய்கள் கோலிக்குண்டு அளவு இருக்கும் போது தெளிக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் மல்லிகை செடியில் வாடல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதைக்கட்டுப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 40 கிராம் என்ற அளவில் டிரைக்கோடெர்மா விரிடி கலந்த தெளிப்பானின் நாசிலை நீக்கி விட்டு வேர்ப்பகுதியில் நேரடியாக ஊற்ற வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் தென்னையில் காண்டமிருக வண்டு பரவலாக தென்படுகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த 6 நாப்தலின் உருண்டைகளை மட்டையின் இடுக்குகளில் வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு தென்னை மரத்திற்கு 75 மில்லி தண்ணீருடன் 25 மில்லி கார்போசல்பான் மருந்தினை கலந்து வேர் வழியாக செலுத்த வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் திரட்சையில் மாவுப்பூச்சியின் தாக்குதல் தென்படுகிறது. இவ்வகை பூச்சியின் தாக்குதலால் பழங்கள் முதிர்வதற்கு முன்பே உதிர்ந்து விடும். இலைகள், காம்புகள், தண்டுகளை சேகரித்து அழிக்க வேண்டும். பழங்கள் தாங்கியுள்ள கிளைகளில் ஒட்டுப்பசை அட்டையை கட்டி வைக்கவும். மேலும் இரைவிமுங்கியான கிரிப்டோலேமெஸ் மான்ட்ரோஜூரி வண்டுகளை ஒரு கொடுக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் விட்டும் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் கால்நடைகளை பாதுகாக்க 3 பெரிய நெல்லிக்காயை இடுத்த தீவனத்துடன் கலந்து கொடுக்கலாம். மேலும் கறவை மாடுகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 1 கைப்பிடி அளவு வெந்தயம், 1 கைப்பிடி அளவு நெல்லிக்காய் வற்றல் போன்றவைகளை நன்கு ஊரவைத்து அரைத்து தீவனத்துடன் கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.

## 4. மலைப்பிரதேச மண்டலம்

வரும் நாட்களில் மலைப்பிரதேச மண்டலமான நீலகிரி மாவட்டத்தில் வானம் மேகழுட்டத்துடன் காணப்படும். வரும் நாட்களுக்கு மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை 22°செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 11°செ ஆகவும், காலை நேர மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 முதல் 55 சதவிகிதமாகவும், பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 1 கி.மீ வீசுவது வெற்பாடுவாய்ப் பெண்டோல்க் கிளையிவிரச்சு ரீசக்ச. வா.

## வேளாண் அறிவுரை

- வரும் நாட்களுக்கு மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு நீர்பாய்ச்சதல் மற்றும் மருந்து தெளிப்பதை தவிர்த்தல் வேண்டும்.
- மழையின் காரணமாக காய்கறி பயிர்களில் வாடல்நோயைக் கட்டுப்படுத்த ட்ரைக்கோடெர்மாவிரிடி 5 கிராம் /லிட்டர் தெளிக்கவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் உருளை கிழங்கு பயிரில் 30ஆம் நாட்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு, 50 கிலோ யூரியா, 266 கிலோ தூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றும் 40 கிலோ பொட்டாஸ் உரம் இடவேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் தேயிலை தோட்டத்தில் அமிலதன்மையை நிலை நிறுத்த டோலோமைட் இடவேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் காய்கறி பயிர்களில் வெள்ளைப் புழுவைக் கட்டுப்படுத்த மெட்டாரைசியம் 20 கிலோ கிராம் நன்கு மக்கிய தொழு உரத்தோடு கலந்து ஒரு ஏக்டருக்கு இட வேண்டும்.
- வெயில் அதிகமான பகல் நேரங்களில் கறவை மாடுகளுக்கு பச்சைபுல், புரதம்-கொழுப்பு தாது உப்புக் கலவை, கொடுக்க வேண்டும். மற்றும் குளிர்ந்த நேரங்களில் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பவேண்டும்.

## 5. வட மேற்கு மண்டலம்

வரும் நாட்களில் வடமேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களான சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் வானம் மேகழுட்டத்துடன் தென்படும். இலேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகல்நேர வெப்பநிலை  $37^{\circ}\text{செ}$  ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை  $26^{\circ}\text{செ}$  முதல்  $27^{\circ}\text{செ}$  ஆகவும் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்று மணிக்கு 6கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

## வேளாண் அறிவுரை

- தற்போது நிலவும் வானிலையால் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு 5 டன் தொழு உரத்துடன் . அடியுரமாக 11 கிலோ யூரியா. 125 கிலோ தூப்பர் பாஸ்பேட், 50 கிலோ பொட்டாஷ் உடன் 80 கிலோ ஜிப்சம் இட்டு விதைப்பு செய்ய வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் தக்காளி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பயிர்களில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை தவிர்க்க வயலைச் சுற்றிலும் வரப்புகளிலும் அகத்தி அல்லது சித்தகத்தி அல்லது ஆமணக்கு விதைகளை 5, 6 அடி இடைவெளியில் விதைப்புச் செய்யவேண்டும்.
- விவசாயிகள் தற்பொழுது பெய்துள்ள கோடை மழையினை பயன்படுத்தி மரவள்ளி (4,5 மாத வயது) பயிரில் மேலுரம் மற்றும் நன்கு மக்கிய தொழுஉரம் இட்டு மண் அணைக்க வேண்டும்.

கொரோனா (கோவிட் 19) நோய்தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள கால்நடை மற்றும் கோழிப்பண்ணையாளர்கள் பண்ணை , வெளி விற்பனையின் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய சில அறிவுரைகள்

- கால்நடைகள். முட்டை மற்றும் கோழிகளை பண்ணை வாயிலில் அல்லது கடைகளில் விற்பனை செய்யும் போது பாதுகாப்பாக முககவசம் மற்றும் கையுறை அணிந்து கொள்ள வேண்டும்.
- கடைகளில் விற்பனையின் போது கூட்டத்தைத் தவிர்த்து சமூக இடைவெளியினைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
- ஆடு. பன்றி அல்லது கோழியை இறைச்சியாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் போது அதற்கு பயன்படுத்தும் உபகரணங்களை முறையாக கழுவி கிருமிநாசினி தெளித்து சுத்தம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும். (5% லைஸால் அல்லது 1 % டைபோகுளோரெட் கரைசல்).
- இறைச்சிக் கழிவுகளை முறையாக அப்பறப்படுத்தி அந்த இடத்தை சுத்தமாக கழுவி கிருமிநாசினி தெளிக்க வேண்டும்.

- பண்ணைகளில் அல்லது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பக் கூடாது, இருமும் போது முழங்கையாலோ அல்லது கை குட்டையாலோ கொண்டு முக்கு மற்றும் வாயினை மூடிக்கொள்ள வேண்டும்.

### கோடை காலத்தில் நாட்டுக்கோழி பராமரிப்பிற்கான ஆலோசனைகள்

- கோழிகளுக்கு நாள் முழுவதும் தரமான குடிநீர் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும்.
- கோடைகாலங்களில் தீவிர முறையில் வளர்த்தப்படும் நாட்டுக்கோழிகள் ஒன்றையொன்று கொத்திக் கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. பெரும்பாலும் பின்பக்கம் கொத்திக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும், இந்த பிரச்சனையினை குறைக்க விவசாயிகள் தீவனத்தில் 0.5 % ( 100 கிலோ தீவனத்திற்கு அரை கிலோ உப்பு ) சமையல் உப்பினை சேர்க்க வேண்டும்.
- கோழிகளில் வெப்ப அயற்சியியை போக்க தரமான குடிநீரில் நெல்லி , மோர் அல்லது எலுமிச்சை பழச்சாறு ( 1.0, 0.3 லிமுக்காடு வரை ) சேர்க்கலாம்.
- கோடைகாலத்தில் தண்ணீரில் நூண்ணுயிர் சமை அதிகமாக இருக்கும். அதை சரி செய்ய தண்ணீரில் பிளிச்சீங் பவுடர் 15 கிராம் - 1000 லிட்டரில் கலக்கலாம் அல்லது வைப்பாஜன் பெராக்ஸைடு 8 மில்லி - 1000 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்கலாம்.
- பொதுவாக நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு விவசாயிகள் வெள்ளை கழிச்சல் நோய்க்கு எதிராக கோழிகளுக்கு தடுப்புசி அளிக்க வேண்டும், அதாவது 7 வது நாள் 1 தடுப்புசி ( கண்ணில் சொட்டு மருந்தாக ). 28 வது நாள் லசோட்டா ( கண்ணில் சொட்டு மருந்தாக ). 56 வது நாள் ஆர்ஷிலோ தடுப்புசி ( ரெக்கையில் போட வேண்டும்.

### 6. வடகிழக்கு மண்டலம்

வரும் நாட்களில் வடகிழக்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட மாவட்டங்களான சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், கடலூர், வேலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இலேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பகல்நேர வெப்பநிலை  $35^{\circ}\text{செ}$  முதல்  $39^{\circ}\text{செ}$  ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை  $26^{\circ}\text{செ}$  முதல்  $28^{\circ}\text{செ}$  ஆகவும் நிலவ வாய்ப்புள்ளது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 75 முதல் 80 சதவிகிதமாகவும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 45 முதல் 55 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்று மணிக்கு 6 முதல் 8 கிமீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

#### வேளாண் அறிவுரை

- தற்போது நிலவும் வானிலையில் மிளகாய் செடியில் இலைப்பேன் தாக்கம் பரவலாக தென்படுகிறது. இதன் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டருக்கு பைப்ரினில் 1.5 மில்லி தெளிக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையில் பூக்கும் பருவம், காய்பிடிக்கும் பருவத்தில் உள்ள நிலக்கடலை பயிருக்கு தழிந்தாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழுத்தின் நிலக்கடலை ரிச் 2 கிலோ / 200 லிட்டர் தண்ணீருக்கு என்ற அளவில் ஒரு ஏக்கருக்கு கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் கத்தரியில் குருத்து துளைப்பான் மற்றும் காய்த்துளைப்பானைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டருக்கு குளோரன்ட்ரைனிலிபுரோல் 0.5 மில்லி அல்லது இமாமெடக்டின் பென்சோலேட் 0.4 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் தென்னையில் வெள்ளை சுருள் ஈக்களின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டருக்கு வேப்பள்ளைய் @ 10 மில்லி அல்லது அசாடிராக்டின் 1% @ 5 மில்லி என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் தர்பூசணியில் சிவப்பு பூசணி வண்டு தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதைக்கட்டுப்படுத்த மாலத்தியான் ஒரு லிட்டருக்கு 1 மில்லி வீதம் தெளிக்கவும்.
- தற்போது அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை உயர்ந்து காணப்படுவதால் கால்நடைகளை காலை 6 மணி முதல் 10 மணிக்கும் வரை 1 மில்லி அல்லது அசாடிராக்டின் 1% வீதம் தெளிக்கவும்.

- கால்நடைகளுக்கு எல்லா நேரங்களிலும் சுத்தமான குளிர்ந்த குடிநீர் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் கலப்பின கறவை மாடுகளில் வெப்ப அயற்சியை கட்டுப்படுத்த நீரை தெளிப்பான் அல்லது நூண் நீர் தெளிப்பானை பகல் நேரங்களில் 12 மணி முதல் 2 மணி அளவில் பயன்படுத்தலாம்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் இறைச்சிக் கோழிகளுக்கு வெப்ப அயற்சி தாக்காமல் இருக்க வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் சி கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.
- தற்போது நிலவி வரும் வானிலையால் வெண் பன்றிகளுக்கு வெப்ப அயற்சி தாக்காமல் இருக்க குடிநீரில் நெல்லிக்காயை (1 லிட்டருக்கு 1 நெல்லிக்காய்) நசுக்கி போட வேண்டும்.

## 7.அதிக மழை பெறும் மண்டலம்

வரும் நாட்களில் வானம் இலேசான மேகழுட்டத்துடன் காணப்படும். வரும் நாட்களில் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை  $35^{\circ}$ செ முதல்  $36^{\circ}$ செ ஆகவும், குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை  $26^{\circ}$ செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 சதவிகிதமாகவும் மாலை நேரக் காற்றின் ஈரப்பதம் 55 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 கி.மீ வேகத்தில் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

### வேளாண் அறிவுரை

- தற்போது நிலவும் வானிலையில் நெல் விஷதுப்பிற்கு நாற்றங்கால் தயார் செய்யவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையால் கிராம்பு கொடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சவும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையில் தென்னையில் சிலந்திப்பூச்சியின் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த அசாடிராக்டின் (50%) 7.5 மி.லி, 7.5 லி தண்ணீரில் கலந்து வேர் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையில் பப்பாளி மரங்களில் அறுவடைக்கு பின் ஏற்படும் பழ அழுகலை தடுக்க மேங்கோசெப் என்ற மருந்தினை ஒரு லிட்டர் நீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து பழம் அறுவடை செய்வதற்கு முன்பு தெளிக்க வேண்டும்.
- மினாகு கொடிகளுக்கு வட்ட பாத்திகள் அமைத்து அவற்றில் வேர் உட்புசனை உரம் மற்றும் மண் புழு உரங்களை இட்டு அதன் மேல் காய்ந்த இலைகளை கொண்டு மூடாக்கு அமைத்து உடனடியாக அதிக நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் மக்குலை அதிகரிக்க செய்யலாம்.
- தற்போது நிலவும் வானிலையில் ரோஜா, மல்லிகை, சம்பங்கி செடிகளில் சாறு உறுஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படும் எனவே இத்தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த புரோப்பனோபாஸ் 2 மி.லி/லிட்டர் இலை வழி தெளிப்பு செய்ய வேண்டும்.

**பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்**

**வேளாண் காலநிலை**

**ஆராய்ச்சி மையம்**