

தூத்துக்குடி மாவட்டத் திற் கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை

(ஆகஸ்டு 29-ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 2-ம் தேதி வரை)

(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்,
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

முந்தைய வார வானிலை (25.8.15- 27.8.15)

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	31- 38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	27
வானம் (ஆக்டா)	3- 7
ஸரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	70- 72
ஸரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	47- 90
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	10- 18
காற்றின் திசை	180- 320

2.9.15 அன்று 08:30 மணியிடன் முடிவடையும் காலத் திற் கான வானிலை முன் நறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன் நறிவிப்பு				
	நாள் 1 29.8.15	நாள் 2 30.8.15	நாள் 3 31.8.15	நாள் 4 1.9.15	நாள் 5 2.9.15
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	31	31	31	31	31
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	27	27	27	28	28
வானம் (ஆக்டா)	5	4	6	7	7
ஸரப்பதம் (சதவீதம்)	51- 69	52- 69	52- 68	51- 66	50- 66
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	24/ தென் மேற்கு	23/ தென் மேற்கு	22/ தென் மேற்கு	18/ தென் மேற்கு	17/ தென் மேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகமான மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஸரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர் / சாகுபடி குழல்	பருவம் / சாகுபடி செயல் கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
நெல்	பசுந்தாள் உரமிடல்	நெற்பயிருக்கு பசுந்தாள் உரமிடுவது உரத்தேவையை குறைக்கவும் மண்வளத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். வரும் செப்டம்பர் - அக்டோபர் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெற்பயிருக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்க பசுந்தாள் உரப்பயிரான தக்கைப்பூண்டினை 20 கிலோ/ எக்டர்

		என்ற அளவில் விதை அளவை பயன்படுத்தி விதைக்கவும்.
மின்காய்	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	மின்காயில் காய்ப்பிடித்தலை மேம்படுத்த என். ஏ. ஏ. (NAA) என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை 10 மில்லி கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவிலும் டிரையாகான்டனால் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை 1.25 மில்லி கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவிலும் தெளிக்கவும்.
தக்காளி	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகழுட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் தக்காளில் காணப்படும் காய்த்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த இன்டோக்சாகாரப் 14.5 % SC 8 மில்லி/ 10 லிட்டர் அல்லது பாசலோன் 35 % EC 13 மில்லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
வாழை	குலை தள்ளும் பருவம்	குலைதன்னும் பருவத்திலுள்ள வாழைக்கு மகசுலை மேம்படுத்த வளர்ச்சி ஊக்கி பிளான்டோசைன் 2 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
சப்போட்டா	காய்க்கும் பருவம்	காய்க்கும் பருவத்திலுள்ள சப்போட்டா மரத்திற்கு தேவையான உரங்களை இடவும். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மரத்திற்கு தொழுநரம் 50 கிலோ, யூரியா 2.2 கிலோ, குப்பர் பாஸ்பேட் 6.25 கிலோ மற்றும் பொட்டாஷ் 1.6 கிலோ என்ற அளவில் மரத்தின் ஆடிப்பகுதியிலிருந்து 45 செ.மீ. தள்ளி இடவும்.

குறுஞ்செய்தி:- மழை: ஆகஸ்ட் 28: 2 மிமீ. செப்டம்பர் -அக்டோபர் பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்வதற்கு தக்கைப்பூண்டினை 20 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் விதை அளவை பயன்படுத்தி விதைக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி