

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற் கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை

(ஆகஸ்டு 29-ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 2-ம் தேதி வரை)

(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண் மை ஆராய்ச்சி நிலையம்,  
தமிழ்நாடு வேளாண் மை பல்கலைக் கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

### முந்தைய வார வானிலை (25.8.15- 27.8.15)

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	37- 38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	23- 26
வானம் (ஆக்டா)	2- 3
ஈரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	56- 61
ஈரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	40- 74
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	2
காற்றின் திசை	320

2.9.15 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற் கான வானிலை முன் னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன் னறிவிப்பு				
	நாள் 1 29.8.15	நாள் 2 30.8.15	நாள் 3 31.8.15	நாள் 4 1.9.15	நாள் 5 2.9.15
மழை (மி.மீ.)	0	0	4	0	3
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	36	36	36	36	36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (ஒக்டோ செல்சியஸ்)	26	25	25	26	26
வானம் (ஆக்டா)	5	4	5	7	7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	37- 69	39- 68	39- 66	37- 63	37- 63
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	13/ மேற்கு	13/ மேற்கு	11/ மேற்கு	11/ மேற்கு	9/ மேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமுட்டம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர் / சாகுபடி சூழல்	பருவம் / சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
நெல்	பசுந்தாள் உரமிடல்	நெற்பயிருக்கு பசுந்தாள் உரமிடுவது உரத்தேவையை குறைக்கவும் மண்வளத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். வரும் செப்டம்பர் - ஆக்டோபர் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெற்பயிருக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்க பசுந்தாள் உரப்பயிரான தக்கைப்பூண்டினை 20 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் விதை அளவை பயன்படுத்தி விதைக்கவும்.

மிளகாய்	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	மிளகாயில் காய்ப்பிடித்தலை மேம்படுத்த என். ஏ. ஏ. (NAA) என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை 10 மில்லி கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவிலும் டிரையாகான்ட்னால் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை 1.25 மில்லி கிராம்/ லிட்டர் என்ற அளவிலும் தெளிக்கவும்.
தக்காளி	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகழுட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் தக்காளில் காணப்படும் காய்த்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த இன்டோக்ஷாகார் ப 14.5 % SC 8 மில்லி/ 10 லிட்டர் அல்லது பாசலோன் 35 % EC 13 மில்லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
வாழை	குலை தள்ளும் பருவம்	குலைதள்ளும் பருவத்திலுள்ள வாழைக்கு மகசுலை மேம்படுத்த வளர்ச்சி ஊக்கி பிளான்டோசைன் 2 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
சப்போட்டா	காய்க்கும் பருவம்	காய்க்கும் பருவத்திலுள்ள சப்போட்டா மரத்திற்கு தேவையான உரங்களை இடவும். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மரத்திற்கு தொழுநரம் 50 கிலோ, யூரியா 2.2 கிலோ, குப்பர் பாஸ்பேட் 6.25 கிலோ மற்றும் பொட்டாஷ் 1.6 கிலோ என்ற அளவில் மரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து 45 செ.மீ. தள்ளி இடவும்.

**குறுஞ்செய்தி-**: மழை: ஆகஸ்டு 31 & செப்டம்பர் 2 ம் தேதிகளில்: 4 & 3 மி.மீ. செப்டம்பர் -அக்டோபர் பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்வதற்கு தக்கைப்பூண்டினை 20 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் விதைக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்  
கோவில்பட்டி