

தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக்கழகம்
கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(04.11.2015 முதல் 08.11.2015)

அறிக்கை எண் 86-2015

தேதி: 03.10.2015

மாநிலத்தின் கடந்த வார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 30° செ முதல் 34° செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 26° செ ஆகவும் பதிவானது. கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல் நேர வெப்பநிலை 15° செ முதல் 21° செ ஆகவும், இரவு நேர வெப்பநிலை 10° செ முதல் 12° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழ் நாட்டில் பல இடங்களில் இலேசானது முதல் மிதமான மழை காணப்பட்டது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (04.11.2015 முதல் 08.11.2015)

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமுட்டத்துடன் காணப்படும். மிதமானது முதல் கன மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை 31° செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 84 முதல் 88 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 78 முதல் 82 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 கி.மீ அளவுக்கு பெரும்பாலும் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடியும்.

தேதி	மழை (மி.மீ)	அதிகப்பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	மேக முட்டம் (ஆக்டா)	அதிகப்பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	குறைந்த பட்ச காற்றினாரப்பதம் (%)	காற்றி வேகம் (கி.மீ/மணி)	காற்று வரும் திசை
04.11.15	25	31	24	7	88	82	8	வடகிழக்கு
05.11.15	18	31	24	7	87	81	8	வடகிழக்கு
06.11.15	10	31	24	7	84	78	8	வடகிழக்கு
07.11.15	16	31	24	7	85	80	8	வடகிழக்கு
08.11.15	16	31	24	7	86	80	8	வடகிழக்கு

வேளாண் அறிவுரை

- ✓ கடந்த மற்றும் நடப்பு வாரங்களில் அதிக மழை மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால் குளிர்கால இறைவை கம்போடியா பருத்தியில் தயிர்நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை கட்டுப்படுத்த 250 கிராம் கார்பன்டசி மருந்தினை 500 லிடர் தண்ணீரில் கலந்து 1 எக்டருக்கு தெளிக்கவும்.
- ✓ குறைந்த வெப்ப நிலை மற்றும் அதிக மழையின் காரணமாக சம்பா பருவத்தில் நடவு செய்துள்ள நெல்லில் துத்தநாக குறைபாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை நிவர்த்தி செய்ய 0.5 சதவீதம் துத்தநாக சல்பேட் மற்றும் 1 சதவீத யூரியா கரைசலை இரு முறை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
- ✓ திராட்சையில், அதிக காற்றின் ஈரப்பதம் மற்றும் குறைந்த வெப்ப நிலை காரணமாக சாம்பல் நோய் மற்றும் அடிச் சாம்பல் நோய் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. சாம்பல் நோயை கட்டுப்படுத்த 0.3 சதவீதம் நனையும் கந்தகத்தையும், 1 சதவீதம் போர்டாக்ஸ் கலவையை அடி சாம்பல் நோய்க்கும் தெளிக்கவும்.
- ✓ தொடர்ந்து ஈரப்பதமான சூழ்நிலை நிலவுவதால் கால்நடை மற்றும் கோழி தீவனங்களில் பூஞ்சாண தாக்குதல் காரணமாக வாந்தி மற்றும் பேதி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்க தீவனங்களை உலர்த்தி பயன்படுத்தவும்.

குறுஞ் செய்தி

- ✓ கடந்த மற்றும் நடப்பு வாரங்களில் அதிக மழை மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருப்பதால் குளிர்கால இறைவை கம்போடியா பருத்தியில் தயிர்நோய் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதை கட்டுப்படுத்த 250 கிராம் கார்பன்டசி மருந்தினை 500 லிடர் தண்ணீரில் கலந்து 1 எக்டருக்கு தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண் காலனிலைஆராய்ச்சி மையம்
த.நா.வெ.ப.கழகம், கோவை.