



அரியலூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(30.09.2015 முதல் 04.10.2015 வரை)

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இ ஆடுதுறை – 612 101
போன் : 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in - Fax: 0435
2472881



தேதி 29.09.15

கடந்த 4 நாளில் நிலவிய வானிலை (25.09.2015 – 28.09.2015)

காரணிகள்	கடந்த வார வானிலை
மழை (மி.மீ)	7.3
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	37 – 39
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	22 – 26
மேக ஸ்டீட்டம்	3 – 6
ஈரப்பதம் (%)	64 – 78
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.)	7 – 13

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	தேதி-1 30,09,15	தேதி-2 01,10,15	தேதி-3 02,10,15	தேதி-4 03,10,15	தேதி-5 04,10,15
மழை (மி.மீ)	4	4	2	0	4
அதிகபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	36	36	35	35	35
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை(டி.செ)	24	24	23	23	23
மேக ஸ்டீட்டம்	6	6	6	6	6
ஈரப்பதம் (%)	55 – 75	56 – 76	54 – 74	54 – 74	52 – 72
காற்றின் வேகம் (கி.மீ.,மணிக்கு)	10	10	10	10	10
காற்றின் திசை	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு

30.09.15 முதல் 04.10.15 வரை வானம் மேகஸ்டீட்டத்துடன் இருள்கூழ்ந்து காணப்படும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் மழை அளவு 2 - 4 மி.மீ.

வேளாண் அறிவுரைகள்

முக்கிய பயிர் நெல்

பருவம் குறுவை - நெல் முதிர்ச்சி மற்றும் அறுவடை பருவம்

பின் சம்பா நடவு பருவம் தாளடி விதைப்பு மற்றும் நாற்ற்கால் தயாரித்தல்

- அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு லேசான மற்றும் மிதமான மழை (2 - 4 மி.மீ). எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை நிலையில் உள்ள குறுவை நெல்லினை தக்க பாதுகாப்புடன் அறுவடை செய்யவும்.
- பின் சம்பா பருவத்தில் நேரடி விதைப்பில் விதைப்பதற்கு முன் விதைகளை சூடோமோனாஸ் என்ற எதிர் உயிரியினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து விதைக்கவும். இதனால் விதைகளின் முளைப்புத்திறன் மற்றும் வீரிய தன்மை அதிகரிக்கும். விதைகள் ஸ்டீலம் பரவக்கூடிய நோய் கிருமிகள் அழிந்து விடும்.
- பின் சம்பா நடவு செய்யும் விவசாயிகள் 1 ஏக்கருக்கு 200 கிலோ ஷிப்சம்? 10 கிலோ ஷிசல்பேட்? 30 கிலோ யூரியா? 40 கிலோ டிஏபி மற்றும் 10 கிலோ பொட்டாசும் ஆகிய உரகளை அடியுரமாக இடவேண்டும். சம்பா நடவிற்கு முன் ஏக்கருக்கு 100 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு இட்டு பூச்சி மற்றும் நுற்புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- சம்பா நெற்பயிரில் இலைசிலந்தியின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைக்கோபால் 500 மி.லி. , ஏக்கர் அல்லது நனையும் கந்தகத்துள் 400 கிராம் , ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- தாளடி பருவத்திற்கு ஆடுதுறை 38? ஆடுதுறை 46? ஆடுதுறை 49 வெள்ளை பொன்னிஇ திருச்சி 3இ மற்றும் டிகேஎம் 13 இரங்களும் சாகுபடி செய்ய சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது.

ஓம்,- வெ. இரவி.

இயக்குநர்

,உண்மை நகல்,

பேராசிரியர்(உழவியல்)