



புதுக்கோட்டை மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
(26-09-2015 – 30-09-2015)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



தேதி: 25-09-2015

கடந்த கால வானிலை 22-09-2015 முதல் 24-09-2015 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	0.3
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	38-39
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	27
மேக மூட்டம்	4-6
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	35-73
காற்றின் வேகம்(கி.மீ / மணி)	10-16

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 30-09-2015 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	26.09.15	27.09.15	28.09.15	29.09.15	30.09.15
மழை (மி.மீ)	4	18	19	10	18
அதிக பட்ச வெப்பநிலை(செ)	36	34	34	34	34
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	26	24	24	24	24
மேக மூட்டம்	5	7	7	7	7
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	86	86	85	86
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	68	75	75	74	75
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	15	15	15	15	15
காற்றின் திசை	தென்கிழக்கு	தென்கிழக்கு	தென்கிழக்கு	தென்கிழக்கு	தென்கிழக்கு

குறுஞ்செய்தி :

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை: லேசான முதல் மிதமான வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வானம் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், மக்காச்சோளம் மற்றும் கரும்பு

பருவம்: குறுவை- நெல் பூக்கும் மற்றும் முதிர்ச்சி பருவம், மக்காச்சோளம்- அறுவடை பருவம்

- அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு இலேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது எனவே மண் மற்றும் பயிரின் வளர்ச்சியை பொருத்து தண்ணீர் பாய்ச்ச ஏற்ப்பாடு செய்யலாம்.
- நெல்லில் குலை நோயினைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு ஹனோசான் 200 மி.லி. அல்லது டிரைசைகலசோல் 200 கிராம் தெளிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஏக்கருக்கு சூடோமோனோஸ் ப்ளாசன்ஸ் 500 கிராம் பவுடரை 200 மி.லி. தண்ணீரில் கலந்து மாலை வேளையில் தெளிக்கவும்.
- நெல் பயிரில் தாக்கும் பச்சைத் தத்துப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த Phosalone 35% EC 120 ml/litre தெளிக்கவும்.
- குறுவை நெற்பயிரில் பூக்கும் பருவ குறுவை நெற்பயிரில் பூக்கும் பருவத்தில் கரும்பு நாவாய் பூச்சி தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த புரோப்பனோபாஸ் 50 இ.சி. மருந்தினை ஏக்கருக்கு 400மில்லி என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- நெற்பயிரில் பழுப்பு நிற நோய் காணப்பட்டால். அதனைக் கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் 10-15 நாட்கள் இடைவெளியில் 2-3 முறை மேன்கோசெப் 2 கிராம்/ லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.