சிவகங்கை மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை

(23-09-2015 – 27-09-2015)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தேதி: 22-09-2015

கடந்த கால வானிலை 18-09-2015 முதல் 21-09-2015 வரை

காரணிகள்	**கடந்த கால வானிலை**
மழை (மி.மீ)	0.3
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	39-40
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25-27
மேக மூட்டம்	5-7
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	39-62
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	11-16

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 27-09-2015 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	**23.09.15**	**24.09.15**	**25.09.15**	**26.09.15**	**27.09.15**
மழை (மி.மீ)	2	3	2	4	6
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	39	39	38	38	38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	26	26	25	25	25
மேக மூட்டம்	6	6	6	6	6
அதிக பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	48	49	50	51	52
குறைந்த பட்ச ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	42	43	44	45	46
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	12	12	12	12	12
காற்றின் திசை	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F

குறுஞ்செய்தி:

mLj;j Ie;J ehl;fSf;fhd thdpiy: Nyrhd kio nga;a tha;g;Gs;sJ. thdk; kpjkhd Nkf%l;lj;Jld; fhzg;gLk.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், எள்ளு, பருப்பு வகைகள் மற்றும் கரும்பு
பருவம்: நெல்- முளைக்கும் பருவம்

- விவசாயிகள் விளை நிலத்தில் ஒரு பகுதியை மட்டும் மழை நீரை சேமித்து வைப்பதற்கு முறையான ஏற்பாடுகள் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில் இந்த மழை நீரை பயன்படுத்தி வறட்சி காலங்களில் பயிர்களுக்கு பாசனம் செய்யவதற்குப் பயன்படுத்த முடியும்.
- நெல் பயிரைத் தாக்கும் தண்டுத் துளைப்பான் பூச்சியினைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்டேப் ஹைட்ரோகுளோரைட் 50 % SP @ 400g/ac அல்லது பாஸ்போமிடான் 40% SL 500 ml/ac தெளிக்கவும்.
- நெல் பயிரைத் தாக்கும் மாவுப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த வேப்ப எண்ணை 2% அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5% அல்லது தையோமீத்தாகசம் 25 WG லிட்டருக்கு 0.6 கிராம் என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்.
- நெல் பயிரில் தாக்கும் பச்சைத் தத்துப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த Phosalone 35% EC 120 ml/litre தெளிக்கவும்.
- நெல் நாற்றங்காலை நன்றாக கவனித்து நெற்பயிரில் குலை நோய் மற்றும் இலைப்புள்ளி நோய் தென்பட்டால் அதனைக் கட்டுப்படுத்த Carbendazim or bavistin @ 2.0gram/litre of water என்ற அளவில் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கவும்.