



**தேனி மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை**

(23-09-2015 – 27-09-2015)

**இணைந்து வழங்குபவர்கள்:** இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சுத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



தேதி: 22-09-2015

**கடந்த கால வானிலை 18-09-2015 முதல் 21-09-2015 வரை**

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	2.9
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	39-40
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	25-27
மேக மூட்டம்	5-7
ஏற்பதம் (சதவீதம்)	39-62
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி)	11-16

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 27-09-2015 - 8.30 மணி நேரம் வரை**

காரணிகள்	23.09.15	24.09.15	25.09.15	26.09.15	27.09.15
மழை (மி.மீ)	5	6	8	12	12
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	38	38	37	37	37
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	25	25	25	25	25
மேக மூட்டம்	6	6	7	7	7
அதிக பட்ச ஏற்பதம் (சதவீதம்)	48	49	50	51	52
குறைந்த பட்ச ஏற்பதம்(சதவீதம்)	46	46	48	48	50
காற்றின் வேகம்(கி.மீ /மணி )	12	12	12	12	12
காற்றின் திசை	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F	njw;F njd;fpof;F

**குறுஞ்செய்தி**

அடுத்த ஜெந்து நாட்களுக்கான வானிலை: லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வானம் மிதமான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்.

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்று வேளாண் ஆலோசனைகள்**

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், மக்காச்சோளம், கரும்பு மற்றும் காய்கறிகள்

பருவம்: நெல்- பூக்கும் மற்றும் முதிர்ச்சி பருவம்

- விவசாயிகள் விளை நிலத்தில் ஒரு பகுதியை மட்டும் மழை நீரை சேமித்து வைப்பதற்கு முறையான ஏற்பாடுகள் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில் இந்த மழை நீரை பயன்படுத்தி வறட்சி காலங்களில் பயிர்களுக்கு பாசனம் செய்யவதற்குப் பயன்படுத்த முடியும்.
- தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் வேர்ப்பகுதியில் ஏற்பத்தைப் பாதுகாக்க தென்னை நார்கழிவுகளைக் கொண்டு மூடவும்.
- நெல் பயிரில் தாக்கும் பச்சைத் தத்துப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த 35% EC 120 ml/litre தெளிக்கவும்.
- நெல் நாற்றங்காலை நன்றாக கவனித்து நெற்பயிரில் குலை நோய் மற்றும் இலைப்புள்ளி நோய் தென்பட்டால் அதனைக் கட்டுப்படுத்த Carbendazim or bavistin @ 2.0gram/litre என்ற அளவில் தண்ணிரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- நெல் பயிரைத் தாக்கும் தண்டுத் துளைப்பான் பூச்சியினைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு கார்டேப் பைஷன்ட்ரோகுளோரைட் 50 % SP @ 400g/ac அல்லது பாஸ்போமிடான் 40% SL 500 ml/ac தெளிக்கவும்.
- நெல் பயிரைத் தாக்கும் மாவுப்பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த வேப்ப எண்ணை 2% அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5% அல்லது தையோமீத்தாகசம் 25 WG 0.6g /litre என்ற அளவில் பயன்படுத்தவும்.