

தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை  
 (செப்டம்பர் 2-ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 6-ம் தேதி வரை)  
 (வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி  
 நிலையம்,  
 தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை  
 துறை)

**முந்தைய வார வானிலை (28.8.15- 31.8.15)**

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	30- 35
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25- 26
வானம் (ஆக்டா)	4
ஈரப்பதம் (08:30 மணி) (சதவீதம்)	73- 61
ஈரப்பதம் (17:30 மணி) (சதவீதம்)	51- 91
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	6- 13
காற்றின் திசை	200- 290

**6.9.15 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு**

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் 1 2.9.15	நாள் 2 3.9.15	நாள் 3 4.9.15	நாள் 4 5.9.15	நாள் 5 6.9.15
மழை (மி.மீ.)	2	3	3	10	6
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	35	35	35	34	34
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	26	26	26	25	25
வானம் (ஆக்டா)	5	5	5	6	6
ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	82- 74	82- 75	83- 76	86- 78	84- 76
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	12/ தெற்கு	12/ தெற்கு	12/ தெற்கு	12/ தெற்கு	12/ தெற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகமான மேகமூட்டம், இலேசான மழை மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர் / சாகுபடி சூழல்	பருவம் / சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனை
நெல்	பசுந்தாள் உரமிடல்	நெற்பயிருக்கு பசுந்தாள் உரமிடுவது உரத்தேவையை குறைக்கவும் மண்வளத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும். வரும் செப்டம்பர் - அக்டோபர் பருவத்தில் சாகுபடி செய்யப்படும் நெற்பயிருக்கு ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்க பசுந்தாள் உரப்பயிரான தக்கைப்பூண்டினை 20 கிலோ/ எக்டர் என்ற அளவில் விதை அளவை பயன்படுத்தி விதைக்கவும்.

தக்காளி	பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் தக்காளில் காணப்படும் காய்த்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்த இன்டோக்சாகார்ப் 14.5% SC 8 மி.லி./ 10 லிட்டர் அல்லது பாசலோன் 35 % EC 13 மி.லி./ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
வாழை	குலை தள்ளும் பருவம்	குலைதள்ளும் பருவத்திலுள்ள வாழைக்கு மகசூலை மேம்படுத்த வளர்ச்சி ஊக்கி பிளான்டோசைன் 2 மில்லி/ லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
சப்போட்டா	காய்க்கும் பருவம்	காய்க்கும் பருவத்திலுள்ள சப்போட்டா மரத்திற்கு தேவையான உரங்களை இடவும். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மரத்திற்கு தொழுஉரம் 50 கிலோ, யூரியா 2.2 கிலோ, சூப்பர் பாஸ்பேட் 6.25 கிலோ மற்றும் பொட்டாஷ் 1.6 கிலோ என்ற அளவில் மரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து 45 செ.மீ. தள்ளி இடவும்.
வடகிழக்கு பருவமழை பருவ சாகுபடி	நிலம் தயாரித்தல்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி வரும் வடகிழக்கு பருவமழை பருவத்தில் மானாவாரியில் பயிர் சாகுபடி செய்வதற்கு ஏதுவாக மானவாரி நிலங்களை உழவு செய்யவும்.

குறுஞ்செய்தி-: மழை: செப்டம்பர் 2- 6ம் தேதி வரை: 2, 3, 3, 10& 6 மி.மீ. தக்காளி- காய்த்துளைப்பான்-  
இன்டோக்சாகார்ப் 14.5% SC 8 மி.லி./10 லிட்டர் தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்  
கோவில்பட்டி