

தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை  
(ஜூலை 13-ம் தேதி முதல் ஜூலை 17-ம் தேதி வரை)

(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய வானிலை துறை)

முந்தைய வார வானிலை (8.7.16- 11.7.16)

மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	30- 38
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	26- 27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6- 8
ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T)	72- 85
ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T)	55- 64
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	12- 23
காற்றின் திசை (டிகிரி)	290

17.7.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் - 1 13.7.16	நாள் - 2 14.7.16	நாள் - 3 15.7.16	நாள் - 4 16.7.16	நாள் - 5 17.7.16
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0.5	4
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	36	36	36	36	35
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	27	27	27	27	26
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	6	7
ஒப்புரர்ப்பதம் (சதவீதம்)	62- 78	62- 78	62- 78	62- 78	72- 85
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	20/மேற்கு	20/மேற்கு	20/மேற்கு	20/மேற்கு	20/மேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகமான காற்று, □□□□□□  
 மேகமூட்டம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண்  
 வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர், சாகுபடி கூழல்	பருவம், சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்
கத்தரி	காய்க்கும் பருவம்	<p>வரும் தினங்களில் காணப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் , அதிக காற்றின் வேகம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் கத்தரியில் பொறிவண்டு மற்றும் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியின் தாக்குதல் தென்படும்</p> <p>எபிலாக்கினா பொறிவண்டை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• வண்டுகள் மற்றும் அதன் கூடுகளை சேகரித்து அழிக்கவும்.</li> <li>• அசாடிராக்கின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம், லிட்டர் அல்லது குயினால்பாஸ் 20 % AF 1.7 மி.லி./ லிட்டர் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தெ□□□□□□□□.</li> </ul> <p>சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• போரேட் 10 % G @15 கிலோ/ எக்டர் அளவில் இடவும். அல்லது பாஸ்போமிடான் 40% SL 1.5 மி.லி./ லிட்டர் அல்லது தயோமிடான் 25% EC.0 மி.லி./ லிட்டர் என்ற அளவில் இடவும்.</li> </ul>
□□□□□□	□□□□□□ □□□ □□□□□□	<p>வெண்டை காய்க்கும் பருவம்வரும் தினங்களில் காணப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் , அதிக காற்றின் வேகம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் வெண்டையில் தண்டுத்துளைப்பான் மற்றும் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• இனக்கவர்ச்சி பொறி எக்டருக்கு 12 என்ற அளவில் வைக்கவும்</li> <li>• பாதிக்கப்பட்ட காய்களை சேகரித்து அழிக்கவும்.</li> <li>• எக்டருக்கு முட்டை ஒட்டுண்ணியான டிரைக்கோகிரம்மா சிலோனிஸ் 1 லட்சம்; என்ற அளவில் விடவேண்டும்.</li> <li>• அசாடிராக்கின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது அசாடிராக்கின் 5% அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 மி.லி./ 10 லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து தெ□□□□□□□□.</li> </ul>

<p>□□□□ (□□□□)</p>	<p>□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□</p>	<p>□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□.</p>
<p>□□□□□□□□ (□□□□□)</p>	<p>□□ரி□ □□□□□□□□ □□□□□□</p>	<p>□□□□□□□ □□□□ 7□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ரி□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□.</p>

குறுஞ்செய்தி- மழை: 8.7.16: 0.5 மி.மீ. □□□□□□ - காய்ப்புழு- கட்டுப்படுத்த  
 அசாடிராக்டின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம்/லி அல்லது  
 வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 மி.லி./10லி தண்ணீர் கலந்து  
 தெ□□□□□□□□□□.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
 வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்  
 கோவில்பட்டி