

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை
(ஜூலை 13-ம் தேதி முதல் ஜூலை 17-ம் தேதி வரை)
(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி
நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும் இந்திய
வானிலை துறை)

(முந்தைய வார வானிலை (8.7.16- 11.7.16))

மழை (மி.மீ.)	3.5
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	34- 36
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25- 27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	2- 3
ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T)	56- 65
ஒப்புரர்ப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T)	47- 51
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	2- 4
காற்றின் திசை (டிகிரி)	320

17.7.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை
முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் - 1 13.7.16	நாள் - 2 14.7.16	நாள் - 3 15.7.16	நாள் - 4 16.7.16	நாள் - 5 17.7.16
மழை (மி.மீ.)	1	1	1	8	40
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	35	35	35	34	34
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25	25	25	24	24
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	4	7	7
ஒப்புரர்ப்பதம் (சதவீதம்)	55- 64	55- 64	55- 64	65- 80	73- 83
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு	3/ வடமேற்கு

வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிகமான மேகமூட்டம், அதிகமான காற்று மற்றும் மிமமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர், சாகுபடி தூழல்	பருவம், சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்
கத்தரி	காய்க்கும் பருவம்	<p>வரும் தினங்களில் காணப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் , அதிக காற்றின் வேகம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் கத்தரியில் பொறிவண்டு மற்றும் சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியின் தாக்குதல் தென்படும்</p> <p>எபிலாக்கினா பொறிவண்டை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> • வண்டுகள் மற்றும் அதன் கூடுகளை சேகரித்து அழிக்கவும். • அசாடிராக்டின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம், லிட்டர் அல்லது குயினால்பாஸ் 20 % AF 1.7 மி.லி./ லிட்டர் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தெ <p>சாறுஉறிஞ்சும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> • போரேட் 10 % G @15 கிலோ/ எக்டர் அளவில் இடவும். அல்லது பாஸ்போமிடான் 40%SL 1.5 மி.லி./ லிட்டர் அல்லது தயோமிடான் 25% EC.0 மி.லி./ லிட்டர் என்ற அளவில் இடவும்.
□□□□□□	□□□□□□ □□□ □□□□□□	<p>வெண்டை காய்க்கும் பருவம்வரும் தினங்களில் காணப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் , அதிக காற்றின் வேகம் மற்றும் மிதமான ஈரப்பதம் கொண்ட வானிலையில் வெண்டையில் தண்டுத்துளைப்பான் மற்றும் காய்ப்புழுவை கட்டுப்படுத்த</p> <ul style="list-style-type: none"> • இனக்கவர்ச்சி பொறி எக்டருக்கு 12 என்ற அளவில் வைக்கவும் • பாதிக்கப்பட்ட காய்களை சேகரி த்து அழிக்கவும். • எக்டருக்கு முட்டை ஒட்டுண்ணியான டிரைக்கோகிரம்மா சிலோனிஸ் 1 லட்சம்; என்ற அளவில் விடவேண்டும். • அசாடிராக்டின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம்/ லிட்டர் அல்லது அசாடிராக்டின் 5% அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 மி.லி./ 10 லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து தெ

	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□.
□□□□□□□□ (□□□□□)	□□ரி□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□ 7□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ரி□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□.

குறுஞ்செய்தி- மழை: 9.7.16& 11.7.16: 1, 2& 1 மி.மீ. □□□□□□ - காய்ப்புழு-
கட்டுப்படுத்த அசாடிராக்டின் 0.03% WSP (300 பிபிஎம்) 5 கிராம்/லி
அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு 5 மி.லி./10லி தண்ணீர் கலந்து
தெ□□□□□□□□□□.

**பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி**