

நீலகிரி மாவட்ட வேளாண் வானிலை முன்னறிக்கை மடல்

**வெளியீடு- தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை.
& இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்**

தேதி 23.08.16

சமீபகாலத்திற்கான வானிலை அறிக்கை:-

1. சமீப காலத்தில் மாவட்டத்தில் லேசான மழை பெறப்பட்டது.
2. தட்பவெப்பம் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் - அதிகபட்ச வெப்பநிலை 18° - 20° செ. மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை 10°-12° செ. ஆக இருந்தது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 82-94% மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80% - 90% இருந்தது. காற்றின் வேகம் 8-17 (கிலோ.மீ./மணிக்கு).

வானிலை குறிப்புகள்	24.08.16	25.08.16	26.08.16	27.08.16	28.08.16
மழை (மி.மீ)	0	0	0	5	2
அதிகபட்ச தட்ப வெப்பம் (° செ.)	19	19	19	18	18
குறைந்தபட்ச தட்ப வெப்பம் (° செ.)	11	11	11	10	10
மேகமூட்டம் (ஓக்லா)	6	6	6	7	7
அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	92	92
குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	88	88	88	90	90
காற்றின் வேகம் (கிலோ.மீ./மணிக்கு)	14	14	14	14	14
காற்றின் திசை	270	270	270	270	270

வானிலை சார்ந்த சாகுபடி குறிப்புகள்

- மாவட்டத்தில் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு மிதமான மழை வரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
- வாழை கன்றுகள் பயிரிடும் போது கன்று ஒன்றுக்கு 10 கிலோ தொழு உரம், 250 கிராம் வேப்பம் புண்ணாக்கு, 25 கிராம் ட்ரைகோடெர்மா, 25 கிராம் சூடோமோனஸ் இட்டு நடவும்.
- வெள்ளை பூண்டில் அறுவடையின் போது ரப்பராகும் நிகழ்வை தடுக்க, யூரியா உரத்தை தவிர்த்து அமோனியம் சல்பேட் இடவேண்டும்.

- தோட்டக்கலைப் பயிர்களில் சாம்பல் நிற வண்டின் தாக்குதல் அதிகம் காணப்படுகிறது. கட்டுப்படுத்த, பாசலோன் 35சதவீத மருந்தை, ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு, 1.5 மில்லி என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.
- மிளகு கொடியில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில், இலைகளின் மீது, ஒரு சதவீத டிஏபி கரைசலை தெளிப்பதன் மூலம், மிளகு பிஞ்சு உதிர்ந்தலை தவிர்த்து அதிக விளைச்சலை பெறலாம்.
- கூடலூர் பகுதியில், ஒரு பாக்கு மரத்திற்கு, 220 கிராம் யூரியா, 220 கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட் மற்றும் 230 கிராம் பொட்டாஸ் உரம் இடலாம்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி
நிலையம், உதகை.