

திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கான வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை
(ஆகஸ்டு 10-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்டு 14-ம் தேதி வரை)
(வெளியீடு: வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், வேளாண்மை ஆராய்ச்சி
நிலையம், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், கோவில்பட்டி மற்றும்
இந்திய வானிலை துறை)
முந்தைய வார வானிலை (5.8.16- 8.8.16)

மழை (மி.மீ.)	0.2
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	35 - 37
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	25 - 27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	2 - 4
ஒப்புரப்பதம்(சதவீதம்) (07:00 LM T)	45 - 66
ஒப்புரப்பதம்(சதவீதம்) (14:00 LM T)	45
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி)	0 - 5
காற்றின் திசை (டிகிரி)	0 - 320

14.8.16 அன்று 08:30 மணியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கான வானிலை
முன்னறிவிப்பு

வானிலை காரணிகள்	வானிலை முன்னறிவிப்பு				
	நாள் - 1 10.8.16	நாள் - 2 11.8.16	நாள் - 3 12.8.16	நாள் - 4 13.8.16	நாள் - 5 14.8.16
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	36	36	36	36	36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டிகிரி செல்சியஸ்)	26	26	26	26	26
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	3	3	3	3	3
ஒப்புரப்பதம் (சதவீதம்)	45 - 56	45 - 56	45 - 56	45 - 56	45 - 56
காற்றின் வேகம் (கி.மீ. / மணி) மற்றும் திசை	4 / வடமேற்கு	4 / வடமேற்கு	4 / வடமேற்கு	4 / வடமேற்கு	4 / வடமேற்கு

வரும் தினங்களில் வறண்ட வானிலை, மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம், கொண்ட வானிலைக்கேற்ற வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்

பயிர்/ சாகுபடி சூழல்	பருவம், சாகுபடி செயல்கள்	வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகள்
நெல்	வளர்ச்சி பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையில் நெல்லில் தண்டுத் துளைப்பானின் தாக்குதல் தென்படுகிறது. கட்டுப்படுத்தும் முறை: பொருளாதார சேதநிலை 25 % இருந்தால் (2 முட்டை குவியல்/ மீட்டர்) முட்டை ஒட்டுண்ணிகளான டிரைக்கோடெர்மா ஜப்பானிக்கம் விட வேண்டும் (அல்லது) வேப்பங்கொட்டைச்சாறு தெளிக்கலாம் (அல்லது) பாசலோன் 35% EC @ 1500 மி.லி./ ஹெக்டேர் அல்லது குளோர்பைரிபாஸ் 20% EC @ 1.25 லி/ ஹெக்டேர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
கத்தரி	காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் வறண்ட வானிலை, மிதமான மேகமூட்டம் மற்றும் ஈரப்பதம், எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கத்தரியில் காய்த்துளைப்பானின் தாக்குதல் தென்படுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த பாதிக்கப்பட்ட காய்களை சேகரித்து அழிக்கவும்; இனக்கவர்ச்சி பொறி எக்டருக்கு 12 என்ற அளவில் வைக்கவும் அல்லது புரப்பனோபாஸ் 1000 மி.லி. / எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
வெண்டை	காய்க்கும் பருவம்	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் மிதமான மேகமூட்டம் கொண்ட வானிலையில் வெண்டையில் தத்துப்பூச்சி தாக்குதல் தென்படுகிறது. தத்துப்பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்த மோனோகுரோட்டோபாஸ் 36 WSC @ 2 மி.லி. / லிட்டர் அல்லது டைமீத்தோயேட் 30 EC @ 2 மி.லி./லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
தோட்டக்கால் பயிர்கள்	நீர்மேலாண்மை	வரும் தினங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் வறண்ட வானிலையில் தோட்டக்கால் பயிர்கள் நீர்பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பயிர் வாட வாய்ப்புகள் உள்ளது. எனவே தேவையான நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

குறுஞ்செய்தி- மழை இல்லை. நெல்- தண்டுத்துளைப்பான்- பாசலோன் 35% EC @ 1500 மி.லி./ ஹெக் (அ) குளோர்பைரிபாஸ் 20% EC @ 1.25 லி/ ஹெக் தெளிக்கவும்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்
கோவில்பட்டி