



இராமநாதபுரம் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை
 (08-12-2016 – 12-12-2016)

இணைந்து வழங்குபவர்கள்: இந்திய வானிலை துறை, பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை, ரெட்டியார்சுத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் மற்றும் மா.ச.சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்



தேதி: 07-12-2016

கடந்த கால வானிலை 02-12-2016 முதல் 06-12-2016 வரை

காரணிகள்	கடந்த கால வானிலை
மழை (மி.மீ)	26.2
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	23-31
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செ)	20-24
மேக மூட்டம்	2-8
ஈர்ப்பதம் (சதவீதம்)	60-93
காற்றின் வேகம்(கி.மீ/மணி)	0-9

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை 11-12-2016 - 8.30 மணி நேரம் வரை

காரணிகள்	08.12.16	09.12.16	10.12.16	11.12.16	12.12.16
	வியாழன்	வெள்ளி	சனி	ஞாயிறு	திங்கள்
மழை (மி.மீ)	0	0	3	0.5	0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செ)	31	31	31	31	31
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை(செ)	23	23	23	23	23
மேக மூட்டம்	5	5	5	5	5
அதிக பட்ச ஈர்ப்பதம் (சதவீதம்)	80	80	80	80	80
குறைந்த பட்ச ஈர்ப்பதம் (சதவீதம்)	75	75	75	75	75
காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	7	7	7	7	7
காற்றின் திசை	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு

குறுஞ்செய்தி :

அடுத்த ஜெந்து நாட்களுக்கு மேகமுட்டத்துடன் கூடிய குளிர்ந்த வானிலையே நிலவும். வரும் 10 மற்றும் 11ம் தேதிகளில் லேசான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வேளாண் ஆலோசனைகள்

முக்கிய பயிர்கள்: நெல், பருத்தி மற்றும் மிளகாய்

- தற்போது நிலவும் மழை மற்றும் பனி மூட்டமான குழ்நிலை காரணமாக நெல்லில் இலை சுருட்டுப்புழு தாக்குதலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த தாவர பூச்சிகொல்லியான அசாடிரக்கண் 0.03 சதக் கரைசலை ஏக்கருக்கு 400 மி.லி. என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
- தற்போது நிலவும் குளிர்ந்த வானிலையின் காரணமாக பருத்தி செடியில் காணப்படும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் நடமாட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு 5 என்ற அளவில் மஞ்சள் ஓட்டும் பொறி வைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம். தேவைப்படின் இமிடாகுளோபிரிட் 200 எஸ்.எல். ஒரு ஏக்கருக்கு 400 மி.லி. என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
- மிதமான மழையின் காரணமாக மண்ணில் உள்ள ஈர்த்தை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களுக்கு உரம் மற்றும் நுண்ணுாட்ந்களை வைப்பதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்
- மழைக்கால வானிலை நிலவுவதால், காய்கறிப் பயிர்களில் வேர் அழுகல் நோய் தாக்கக்கூடும். இதற்கு பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் கார்பென்பாசிம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 கிராம் என்ற விகிதத்தில் கலந்து ஊற்ற வேண்டும்.
- மழைக்கால வானிலை நிலவுவதால், காய்கறிப் பயிர்களில் வேர் அழுகல் நோய் சப்பைநோய், தொண்டைஅடைப்பான் நோய், குடற்புழுக்கள் மற்றும் உருண்டைபுழுக்கள் தாக்குதல் காணப்படும் இதன் காரணமாக மாடுகள், கன்றுகளில் கழிச்சல், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும், இதனைத்தடுக்க மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் 3 மற்றும் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை குடற்புழுநீக்கம் செய்யவேண்டும்.