

**நீலகிரி மாவட்ட வேளாண் வானிலை முன்னாரிக்க மடல்**

**வெளியீடு- தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைகழகம், தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை.**  
**& இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்**

**தேதி 23.02.16**

**சமீபகாலத்திற்கான வானிலை அறிக்கை:-**

1. சமீப காலத்தில் மாவட்டத்தில் மழை பெறப்படவில்லை.
2. தட்பவெப்பம் மற்றும் காற்றின் ஈரப்பதம் - அதிகபட்ச வெப்பநிலை  $17^{\circ}$  -  $23^{\circ}$  செ. மற்றும் குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை  $9^{\circ}$  -  $10^{\circ}$  செ. ஆக இருந்தது. காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 59-89% மற்றும் மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70-84% இருந்தது. காற்றின் வேகம் 7-21 (கிலோ.மீ./மணிக்கு).

வானிலை குறிப்புகள்	24.02.16	25.02.16	26.02.16	27.02.16	28.02.16
மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச தட்ப வெப்பம் ( $^{\circ}$ செ.)	22	22	22	22	22
குறைந்தபட்ச தட்ப வெப்பம் ( $^{\circ}$ செ.)	9	9	9	9	9
மேகமுட்டம் (ஒக்டா)	6	6	6	6	6
அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	45	45	45	65	65
குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	75	75	75	78	78
காற்றின் வேகம் (கிலோ.மீ./மணிக்கு)	9	9	9	9	9
காற்றின் திசை	110	110	110	110	110

**வானிலை சார்ந்த சாகுபடி குறிப்புகள்**

- மாவட்டத்தில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மழை வராது என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
- வெள்ளை பூண்டில் அறுவடையின் போது ரப்பராகும் நிகழ்வை தடுக்க, யூரியா உரத்தை தவிர்த்து அமோனியம் சல்பேட் இடவேண்டும்.
- காபி தோட்டத்தில், கோழே விழும் பழங்களை அப்புறப்படுத்தல் மற்றும் அறுவடை கால முடிவில் மீதமின்றி முழுவதுமாக அறுவடை செய்வதன் மூலம் காபி பழத்துவமைப்பான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- தேயிலை தோட்டத்தில் சிவப்பு சிவந்தி தாக்குதல் தென்பட்டால், வேப்பென்னை அல்லது ப்ராப்ர்கைட் அல்லது ப்ரபனோபாஸ் அல்லது ஸ்டெகோபால் 2 மில்லி ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
- கோடைகாலத்தில் கோட்ட, பீன்ஸ், கோஸ் மற்றும் வெள்ளை பூண்டு ஆகிய பயிர்களில் வளரும் களைகளை கட்டுப்படுத்த ப்ரெக்கோராளின் களைகொல்லி மருந்தை நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தலாம்.

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்  
 தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், உதகை