



அரியலூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(01.10.2016 முதல் 05.10.2016 வரை)
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஆடுதுறை- 612 101
போன்: 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in Fax: 0435 2472881



தேதி:30.09.16

கடந்த 3 நாட்களில் நிலவிய வானிலை (27.09.2016– 29.09.2016)

காரணிகள்	கடந்த நாட்களில் வானிலை
மழை (மி.மீ.)	0.0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	35 – 38
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	27
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6 – 7
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44 – 67
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	10 – 17

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	நாள் 1 01.10.2016	நாள் 2 02.10.2016	நாள் 2 03.10.2016	நாள் 4 04.10.2016	நாள் 5 05.10.2016
மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	37	37	37	37	37
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	26	26	26	26	26
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	5	5	5
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47 – 65	47 – 65	47 – 65	47 – 65	47 – 65
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	15	15	15	15
காற்றின் திசை	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு

01.10.2016 முதல் 05.10.2016 வரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருள்கூழ்ந்து காணப்படும்.

மழை இல்லை.

வேளாண் அறிவுரைகள் :

பயிர் : நெல், உளுந்து, எள், கரும்பு மற்றும் பருத்தி

பருவம் : குறுவை : முதிர்ச்சி பருவம் சம்பா : நடவு மற்றும் இளம் பயிர் தாளடி : விதைப்பு மற்றும் நாற்றங்கால் தயாரித்தல்

- தாளடி பருவத்திற்கு ஆடுதுறை 38, ஆடுதுறை 46, ஆடுதுறை 49, மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி, திருச்சி 3, மற்றும் டிகேஎம் 13 இரகங்களும் சாகுபடி செய்ய சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது.
- தாளடி பருவத்தில் நேரடி நெல் விதைப்பில் விதைப்பதற்கு முன் விதைகளை சூடோமோனாஸ் என்ற எதிர் உயிரியினை ஒரு கிலோ விதைக்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் விதை நோத்தி செய்து விதைக்கவும். இதனால் விதைகளின் முளைப்புத்திறன் மற்றும் வீரிய தன்மை அதிகரிக்கும். விதைகள் மூலம் பரவக்கூடிய நோய் கிருமிகள் அழிந்து விடும்.
- தாளடி நாற்றங்காலில் ஒரு சென்ட்க்கு 1 கிலோ வீதம் டி.ஏ.பி மேலுரமாக இடவேண்டும்.
- தாளடி பருவ நெல் நடவு செய்யும் விவசாயிகள் 1 ஏக்கருக்கு 200 கிலோ ஜிப்சம், 10 கிலோ ஜிங்சல்பேட், 30 கிலோ யூரியா, 40 கிலோ டி.ஏ.பி மற்றும் 10 கிலோ பொட்டாஷ் ஆகிய உரங்களை அடியுரமாக இடவேண்டும். தாளடி நடவிற்கு முன் ஏக்கருக்கு 100 கிலோ வேப்பம்புண்ணாக்கு இட்டு பூச்சி மற்றும் நூற்புழுக்களை கட்டுப்படுத்தலாம்.
- சம்பா நெற்பயிரில் இலைசிலந்தியின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைக்கோபால் 600 மி.லி. / ஏக்கர் அல்லது நனையும் கந்தகத்தூள் 400 கிராம் / ஏக்கர் என்ற அளவில் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

ஓம்/- வெ. இரவி.
இயக்குநர்

/உண்மை நகல்/

பேராசிரியர்(உழவியல்)