



jpz;Lf;fy; khtl;l thdpyi rhh;e;j Ntshz; MNyhrid mwpf;if

(01-02-2017 – 05-02-2017)

,ize;J toq;Fgth;fs;; ,e;jpa thdpyi Jiw> gpuhe;jpa thdpyi ikak; nrd;id>
nul;bahh;rj;jpuk; tpij cw;gj;jpahsh;fs; rq;fk; kw;Wk; kh.r.rhkpehjd;
Muha;r;rp epWtdk;



Njjp: 31-01-2017

fle;j fhy thdpyi 27-01-2017 Kjy; 30-01-2017 tiu

fhuzpfs;	fle;j fhy thdpyi
kio (kp.kP)	20.5
mjpf gl;r ntg;gepiy (nr)	29-32
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy (nr)	22-23
Nkf %l;lk;	4-7
<ug;gjk; (rjtPjk;)	48-83
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	9-16

vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyi 05-02-2017 - 8.30 kzp Neuk; tiu

fhuzpfs;	01-02-2017	02-02-2017	03-02-2017	04-02-2017	05-02-2017
	Gj;d;	tpahod;	nts;sp	rdp	QhapW
kio (kp.kP)	0	0	0	0	0
mjpf gl;r ntg;gepiy (nr)	31	31	31	31	31
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy(nr)	21	21	20	20	20
Nkf %l;lk;	6	6	6	6	6
mjpf gl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	70	70	65	65	65
Fiwe;j gl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	67	67	62	62	62
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	16	16	13	13	13
fhw;wpd; jpir	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F

FWQ;nra;jp :

mLj;j Ie;J ehl;fSf;F nghJthf Nkf%l;lj;Jld; \$ba thdpyiNa epyTk;. kio nga;tjw;fhd tha;g;G ,y;iy
vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyi;Nfw;w Ntshz; MNyhrids;

Kf;fpa gaph;fs;; gUj;jp> kf;fhr;Nrhsk;> fha;fwp gaph;fs;> thio

- தற்போது நிலவி வரும் பருவ நிலை மாற்றத்தில் தென்னையில் இலை கருகல் நோய் பரவலாக காணப்படுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த மரம் ஒன்றுக்கு 1 சதம் போர்டாக்ஸ் கலவை அல்லது 0.25 காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடை கலந்து தெளிக்கவும். மேலும் 2 கிராம் கார்பன்டாசின் அல்லது 2 மிலி ஹெக்சகோனாசோல் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை 100 மிலி தண்ணீரில் கலந்து 3 மாத இடைவெயில் 3 முறை செலுத்தவும்.
- கொடி வகை காய்கறி பயிர்களில் பழ ஈக்களின் நடமாற்றும் காணப்படுகிறது. இதனை 1 ஏக்கருக்கு இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை 10 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை வைத்து கவர்ந்து அளிக்கவும். மேலும் 2 மிலி மாலாத்தியான் அல்லது தைமீதோன்யோட் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்பத்தவும்.
- தற்போது நிலவி வரும் பருவ நிலை மாற்றத்தில் பருத்தியில் மெக்னீசியம் சத்து பற்றாக்குறையை போக்குதல் மிக முக்கியமானதாகும். 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20 கிராம்

மெக்னீசியம் சல்பேட் மற்றும் 10 கிராம் யூரியாவை நன்கு கரைத்து 15 நாட்கள் இடைவெளியில் பற்றாக்குறை நீங்கும் வரை தெளிக்க வேண்டும்.

• நெகிழித்தாள்களை பயன்படுத்தி நிலத்தின் உயரமான பகுதிகளில் தற்காலிக பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து நீரினை சேகரித்து நகரும் தெளிப்பான் மூலம் தண்ணீரை தெளித்து இக்கட்டான் வளர்ச்சி பருவத்தில் பயிர்களை வறட்சியின் பிடியில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.

• தற்போது நிலவி வரும் குளிர்ந்த வானிலையில் காரணமாக கால்நடைகளை மேச்சலுக்கு தூரியன் உதித்து 2 மணி நேரத்திற்கு பின்பு அனுப்ப வேண்டும், மாட்டு கொட்டகைகளை சுற்றி கோணி சாக்கு பை கொண்டு மறைத்து கட்டவும், கொட்டகைகளை ஈரப்பதம் இல்லாதது நன்கு உலர்ந்து இருக்கும்மாறு பார்த்துக்காள்ள வேண்டும். மேலும் உலர்ந்த தீவனங்களையோ, பசுந் தீவனங்கள் கொடுக்கும் போது ஈரப்பதம் இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டும்.