



**kjiu khtl;l thdpyi rhh;e;j Ntshz; MNyhrid mwpf;if
 (01-02-2017 – 05-02-2017)
 ,ize;J toq;Fgth;fs;; ,e;jpa thdpyi Jiw> gpuhe;jpa thdpyi ikak; nrd;id>
 nul;bahh;rj;jpuk; tpij cw;gj;jpahsh;fs; rq;fk; kw;Wk; kh.r.rhkpehjd;
 Muha;r;rp epWtdk;**



Njjp: 31-01-2017

fle;j fhy thdpyi 27-01-2017 Kjy; 30-01-2017 tiu

fhuzpfs;	fle;j fhy thdpyi
kio (kp.kP)	3.3
mjpfgl;r ntg;gepiy (nr)	29-32
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy (nr)	22-23
Nkf %ol;lk;	4-7
<ug;gjk; (rjtPjk;)	48-83
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	9-16

vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyi 05-02-2017 - 8.30 kzp Neuk; tiu

fhuzpfs;	01-02-2017	02-02-2017	03-02-2017	04-02-2017	05-02-2017
	Gjd;	tpahod;	nts;sp	rdp	QhapW
kio (kp.kP)	0	0	0	0	0
mjpfgl;r ntg;gepiy (nr)	31	31	31	31	31
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy(nr)	21	21	20	20	20
Nkf %ol;lk;	6	6	6	6	6
mjpfgl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	70	70	65	65	65
Fiwe;j gl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	67	67	62	62	62
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	16	16	13	13	13
fhw;wpd; jpir	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F

FWQ;nra;jp

mLj;j le;j ehl;fSf;F nghJthf Nkf%ol;l;j;Jld; \$ba thdpyiNa epyTk;. kio nga;tjw;fhd tha;g;G ,y;iy

vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyif;Nfw;w Ntshz; MNyhridfs;

Kf;fpa gaph;fs; : gUj;jp> ney;> fha;fwp kw;Wk; thio

- தற்போது நிலவி வரும் பருவ நிலை மாற்றத்தில் கரும்பு பயிரில் வெள்ளை ஈக்கள் மற்றும் இலைப்பேன் நடமாற்றும் தென்படுகிறது.இவற்றைக்கட்டுப்படுத்த முதலில் நல்ல வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும், காய்ந்த சோகைகளின் 5 முதல் 7 வது மாதங்களில் சோகைகளை களைந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். மேலும் அதிக தழைச்சத்து நிறைந்த உரங்கள் இடுவதில் தவிர்க்க வேண்டும்
- தற்போது நிலவி வரும் பருவ நிலை மாற்றத்தில் தென்னையில் இலை கருகல் நோய் பரவலாக காணப்படுகிறது. இதனை கட்டுப்படுத்த மரம் ஒன்றுக்கு 1 சதம் போர்டாக்ஸ் கலவை அல்லது 0.25 காப்பர் ஆக்சிகுலோரைடை கலந்து தெளிக்கவும். மேலும் 2 கிராம் கார்பன்டாசின் அல்லது 2 மிலி ஹெக்சகோனாசோல் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை 100 மிலி தண்ணீரில் கலந்து 3 மாத இடைவெயில் 3 முறை செலுத்தவும்.
- நெகிழித்தாள்களை பயன்படுத்தி நிலத்தின் உயரமான பகுதிகளில் தற்காலிக பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து நீரினை சேகரித்து நகரும் தெளிப்பான் மூலம் தண்ணீரை

தெளித்து இக்கட்டான வளர்ச்சி பருவத்தில் பயிர்களை வறட்சியின் பிடியில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.

- தற்போது நிலவிவரும் பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக நெற்பயிரில் புகையான் தாக்குதல் பரவலாக காணப்படும். நெல் வயல்களில் எரித்தது போன்ற அறிகுறிகள் ஆங்காங்கே தென்படும். தழுச்சத்து உரங்களை 3-4 முறை பிரித்து இடவேண்டும். செயற்கை பயன்படுத்தக்கூடாது. 3மு வேப்ப எண்ணெய் கரைசலை ஏக்கருக்கு 6 லிட்டர் என்ற அளவில் சோப்பு கரைசலுடன் கலந்து தெளிக்க வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லிகளான டைக்குளோர்வாஸ் 76மு எஸ் சி 200 மி.லி.: ஏக்கர் (அ) :புப்ரோசின் 25மு எஸ் சி 320மி.லி.: ஏக்கர் (அ) பிப்ரோனில்ரமு எஸ் சி 400மி.லி.: ஏக்கர்(அ) இமிடாகுளோபிரிட் 17.8மு எஸ் சி 40மி.லி.: ஏக்கர் என்ற அளவில் தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
- தற்போது நிலவி வரும் குளிர்ந்த வானிலையில் காரணமாக கால்நடைகளை மேச்சலுக்கு சூரியன் உதித்து 2 மணி நேரத்திற்கு பின்பு அனுப்ப வேண்டும், மாட்டு கொட்டகைகளை சுற்றி கோணி சாக்கு பை கொண்டு மறைத்து கட்டவும், கொட்டகைகளை ஈர்ப்பதம் இல்லாதது நன்கு உலர்ந்து இருக்கும்மாறு பார்த்துக்காள்ள வேண்டும். மேலும் உலர்ந்த தீவனங்களையோ, பசுந் தீவனங்கள் கொடுக்கும் போது ஈர்ப்பதம் இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டும்.