

**GJf;Nfh;il kht;l thdpyi rhh;ej Ntshz; MNyhrid mwpf;if
(01-02-2017 – 05-02-2017)**



,ize;J toq;Fgth;fs;:,e;jpa thdpyi Jiw> gpuhe;jpa thdpyi ikak; nrd;id>nul;bahh;rj;jpuk; tpij cw;gj;jpahsh;fs; rq;fk; kw;Wk; kh.r.rhkpehjd;
Muha;r;rp epWtdk;



Njjp: 31-01-2017

fle;j fhy thdpyi 27-01-2017 Kjy; 30-01-2017 tiu

fhuzpfs;	fle;j fhy thdpyi
kio (kp.kP)	23.6
mjp gl;r ntg;gepiy (nr)	26-31
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy (nr)	23-24
Nkf %l;lk;	3-8
<ug;gjk; (rjtPjk;)	43-91
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	11-21

vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyi 05-02-2017 - 8.30 kzp Neuk; tiu

fhuzpfs;	01-02-2017	02-02-2017	03-02-2017	04-02-2017	05-02-2017
	Gjd;	tpahod;	nts;sp	rdp	QhapW
kio (kp.kP)	0	0	0	0	0
mjp gl;r ntg;gepiy (nr)	32	32	32	32	32
Fiwe;j gl;r ntg;gepiy(nr)	21	21	20	20	20
Nkf %l;lk;	7	7	5	5	5
mjp gl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	80	80	80	75	75
Fiwe;j gl;r <ug;gjk; (rjtPjk;)	78	78	73	73	73
fhw;wpd; Ntfk; (fp.kP/kzp)	12	12	10	10	10
fhw;wpd; jpir	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F	fpof;F

FWQ;nra;jp :

mLj;j Ie;J ehl;fSf;F nghJthf Nkf%l;lj;Jld; \$ba thdpyiNa epyTk;. kio nga;tjw;fhd tha;g;G ,y;iy

vjph;ghh;f;fg;gLk; thdpyi;Nfw;w Ntshz; MNyhrids;

Kf;fpa gaph;fs;: ney; kw; Wk; fha;fwp

- தற்போது நிலவி வரும் ஈரப்பதமான சூழலை பயன்படுத்தி நிலக்கடலை பயிருக்கு தேவையான ஊட்சசத்துக்கள் மற்றும் வளர்ச்சியூக்கிகள் கலந்த பூஸ்டர் தெளித்து விளைச்சலை அதிகப்படுத்தலாம். 1 ஏக்கருக்கு 2 கிலோ நிலக்கடலை வளர்ச்சியூக்கி கலந்த பூஸ்டரை மற்றும் தேவையான அளவு ஒட்டும் திரவத்துடன் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பூக்கும் மற்றும் காய் பிடிக்கும் பருவங்களில் தெளிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் பூக்கள் உதிர்வது தடுக்கப்படுகிறது விளைச்சல் 15 சதவிகிதம் கூடுகிறது மற்றும் வளர்ச்சியை தாங்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறது.
- கொடி வகை காய்கறி பயிர்களில் பழ ஈக்களின் நடமாற்றும் காணப்படுகிறது. இதனை 1 ஏக்கருக்கு இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை 10 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சி பொறிகளை வைத்து கவர்ந்து அளிக்கவும். மேலும் 2 மிலி மாலாத்தியான் அல்லது டைமீதோன்யோட் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்பத்தவும்.

- மிளகாயில் போராண் சத்து பற்றாக்குறையை போக்க 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 3 கிராம் போராக்ஸ்சை நன்கு கரைத்து அந்த கரைசலை 10 நாள் இடைவெளியில் இலைவெளி தெளிப்பாக தெளிக்கவும்.
- நெகிழித்தாள்களை பயன்படுத்தி நிலத்தின் உயரமான பகுதிகளில் தற்காலிக பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்து நீரினை சேகரித்து நகரும் தெளிப்பான் மூலம் தண்ணீரை தெளித்து இக்கட்டான் வளர்ச்சி பருவத்தில் பயிர்களை வறட்சியின் பிடியில் இருந்து பாதுகாக்கலாம்.
- தற்போது நிலவி வரும் குளிர்ந்த வானிலையில் காரணமாக கால்நடைகளை மேச்சலுக்கு சூரியன் உதித்து 2 மணி நேரத்திற்கு பின்பு அனுப்ப வேண்டும், மாட்டு கொட்டகைகளை சுற்றி கோணி சாக்கு பை கொண்டு மறைத்து கட்டவும், கொட்டகைகளை ஈரப்பதம் இல்லாதது நன்கு உலர்ந்து இருக்கும்மாறு பார்த்துக்காள்ள வேண்டும். மேலும் உலர்ந்த தீவனங்களையோ, பசந் தீவனங்கள் கொடுக்கும் போது ஈரப்பதம் இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டும்.