திருவாரூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(28.06.2017 முதல் 02.07.2017 வரை)
தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஆடுதுறை– 612 101
போன்: 0435 2472098 E-mail: dirtrri@tnau.ac.in Fax: 0435 2472881

==

தேதி:27.06.2017

கடந்த 4 நாட்களில் நிலவிய வானிலை (23.06.2017– 26.06.2017)

காரணிகள்	கடந்த நாட்களில் வானிலை
மழை (மி.மீ.)	1.6
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	35 – 38
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	29 – 30
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	4
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	61 – 73
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4 - 6

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

காரணிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை				
	நாள் 1 28.06.2017	நாள் 2 29.06.2017	நாள் 2 30.06.2017	நாள் 4 01.07.2017	நாள் 5 02.07.2017
மழை (மி.மீ.)	0	2	1	7	3
அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°C)	36	37	37	37	36
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°C)	27	27	26	26	26
மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	8	8
காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40 – 60	40 – 60	45 – 64	45 – 64	45 – 64
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	10	10	10
காற்றின் திசை	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு

24.06.2017 முதல் 28.06.2017 வரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மழை அளவு 1 – 7 மி.மீ.

வேளாண் அறிவுரைகள் :

பயிர் : நெலமற்றும் நெல் தரிசுபருத்தி

பருவம்: நெல் தரிசுபருத்தி: காய் பிடிக்கும்பருவம்

- திருந்தியநெல் சாகுபடிசெய்யும் விவசாயிகள், இரண்டரைசென்ட் நிலத்தில் மேட்டு பாய் நாற்றங்காலில் 5 கிலோ இரண்டாம் கொம்பு நெல் விதையைசீராக தூவிநாற்றுவிடவும். முதல் ஐந்துநாள் வரை பூவாளிஉதவியுடன் நாற்றங்கால் நன்குநனையும்படிகாலைஅல்லதுமாலைவேளைகளில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். ஆறாம் நாளிலிருந்துபாய் நாற்றங்காலைச் சுற்றியுள்ளவாய்க்காலில் நாற்றுப்படுகைநன்குநனையும்படிதண்ணீரைபாய்ச்சவேண்டும். நாற்றுவிட்டஒன்பதாம் நாள் மாலைவேளையில் 0.5 சத யூரியாகரைசலைதெளிக்கவும். நாற்றுபறிப்பதற்கு இரண்டுநாள் முன்பாகதண்ணீர் பாய்ச்சுவதைநிறுத்தவேண்டும். நாற்றுவிட்ட 14ஆம்நாள் நாற்றுகள் நடவிற்குதயார் ஆகிவிடும்.
- குறுவைபருவத்திற்குநாற்றங்கால் தயார் செய்யும் போதுஒருஎக்டருக்கான 20 சென்ட் நாற்றங்காலில் ஒருடன் தொழுஉரம் அல்லதுகம்போஸ்ட் இடவேண்டும். கடைசிஉழவின் போதுநாற்றங்காலுக்கு 40 கிலோடிஏபிஉரம் அடியுரமாக இடவேண்டும். களிமண் நிலத்திற்கு 4 கிலோ ஜிப்சமும்,ஒருகிலோ டி.ஏ.பி. ஒருசென்ட் நாற்றங்காலுக்குஎன்றஅளவில் விதைத்த 10 ஆம் நாள் இடவேண்டும். இது வேர் அறுபடாமல் நாற்றுக்களைபறிக்கஉதவும்.
- பருத்தியில் காய் புழுவின் தாக்குதல் பரவலாகதென்படுகிறது. இதனைக் கட்டுப்படுத்தஏக்கருக்கு இன்டாக்சாகார்ப் 15.8 SC 200 மி.லிஎன்றஅளவில் தெளிக்கவும்.

கால்நடைகளுக்கு

- தினமும் கறவைமாடுகளுக்கு 1-2 கிலோவும் மற்றகால்நடைகளுக்கு 0.5-1 கிலோவும் அசோலாகொடுக்கலாம்.
- பசுந்தீவனம் மற்றும் அடர்தீவனத்தின் அளவைபகல் நேரத்தில் அதிகரித்தும்,வைகோல் போன்றஉலர்தீவனத்தைகுறைந்தஅளவு அதிகாலைமற்றும் இரவு நேரங்களில் கொடுக்கவும்.

இயக்குநர்