



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 30-12-2022

திருவள்ளூர்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-12-30 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-02	2023-01-03	2023-01-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	50	60
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4.0	8.0	8.0	6.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	50	70	90	70	50
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	0	0	4	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

ஜனவரி 3 & 4ஆம் தேதி அன்று மிகவேசான மழைப் பொழிவு எதிர் பார்க்கலாம்; காற்றின் வேகம் மணிக்கு சுமார் 4.0-10.0 கி.மீ என்றளவில் வீசக் கூடும் ; காற்றின் திசையானது வடக்கு கிழக்கு முதல் கிழக்கு நோக்கி வீசக்கூடும்; அதிகபட்ச வெப்பநிலை முறையே 33.0°C-34.0°C-ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 24.0°C-25.0°C-ஆகவும் எதிர் பார்க்கலாம்; காலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 90%-ஆகவும் மற்றும் மாலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 50-60%-ஆகவும் காணப்படலாம்.

ஜனவரி 3 & 4ஆம் தேதி அன்று மிகவேசான மழைப் பொழிவு எதிர் பார்க்கலாம்; காற்றின் வேகம் மணிக்கு சுமார் 4.0-10.0 கி.மீ என்றளவில் வீசக் கூடும் ; காற்றின் திசையானது வடக்கு கிழக்கு முதல் கிழக்கு நோக்கி வீசக்கூடும்; அதிகபட்ச வெப்பநிலை முறையே 33.0°C-34.0°C-ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 24.0°C-25.0°C-ஆகவும் எதிர் பார்க்கலாம்; காலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 90%-ஆகவும் மற்றும் மாலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 50-60%-ஆகவும் காணப்படலாம்.

ஜனவரி 3 & 4ஆம் தேதி அன்று மிகவேசான மழைப் பொழிவு எதிர் பார்க்கலாம்; காற்றின் வேகம் மணிக்கு சுமார் 4.0-10.0 கி.மீ என்றளவில் வீசக் கூடும் ; காற்றின் திசையானது வடக்கு கிழக்கு முதல் கிழக்கு நோக்கி வீசக்கூடும்; அதிகபட்ச வெப்பநிலை முறையே 33.0°C-34.0°C-ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே 24.0°C-25.0°C-ஆகவும் எதிர் பார்க்கலாம்; காலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 90%-ஆகவும் மற்றும் மாலை நேரங்களில் நிலவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் முறையே 50-60%-ஆகவும் காணப்படலாம்.

காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.
காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக நிலவுவதால் பூச்சி நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது, எனவே விவசாயிகள் பயிர்களில் நோய் மற்றும் பூச்சி நடமாட்டத்தைக் கண்காணிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளாபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	<p>சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.</p>
நெல்	<p>வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p>
நெல்	<p>கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழி நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.</p>
நிலக்கடலை	<p>விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.</p>
நெல்	<p>வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p>
நெல்	<p>கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழி நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4.</p>

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மிலி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்ஸிட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்ஸைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மிலி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்ஸிட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	<p>கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.</p>
நிலக்கடலை	<p>விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.</p>
நெல்	<p>வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1.தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்னாபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.</p>
நெல்	<p>கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.</p>
நிலக்கடலை	<p>விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.</p>
நெல்	<p>வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1.தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்னாபெண்டியாமைடு</p>

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1.தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ரோபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1.தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்டெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாஃபோபாக்டீரியா 10 பாக்டெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1.தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1.நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்-

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்ஸிட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர் ஹைட்ராக்ஸைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2. கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்ஸிட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதை நேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்கோபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.
நெல்	வேர் தூர் கட்டுதல் முதல் தண்டு வளர்ச்சி நிலை- 1. தண்டுத்துளைப்பான்- ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு ப்ளூபெண்டியாமைடு 20% WP 50 கிராம் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 2. இலை சுருட்டுப்புழு- ஏக்கருக்கு குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 18.5% SC 60 கிராம் வீதம் அல்லது ஏக்கருக்கு அசாடிராக்ட்டின் 0.03% 400 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
நெல்	கதிர் உருவாக்கம் முதல் பூ பூக்கும் பருவம்-1. நெற்பழ நோய்- ஏக்கருக்கு ப்ரோபிகோனாசால் 25 EC @ 200 மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது 50% பூ பூக்கும் தருணம் மற்றும் தண்டு உருள் கதிர் வரும் பருவத்தில் ஏக்கருக்கு காப்பர்

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	ஹைட்ராக்சைட் 77 WP @ 500 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.கதிர் நாவாய்ப்பூச்சி- ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பங்கொட்டைச்சாறு 5% தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும். அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு மாலதியன் 50 EC 200 மிலி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்; 3. இலைக் கருகல் நோய்- ஏக்கருக்கு இரண்டு முறை காப்பர் ஹைட்ராக்ஸிட் 77 WP 500 கிலோ கிராம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 4. நெல் மணி நிறமாற்ற நோய்- 50% பூக்கும் நிலையில் ஏக்கருக்கு டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரை ஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG @ 80 கிராம் வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்.
நிலக்கடலை	விதை நேர்த்தி- ஒரு கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் டிரைகோடெர்மா விரிடி அல்லது ஒரு கிலோ விதைக்கு சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரெஸ்சன்ஸ் 10 கிராம் வீதம் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்யலாம். விதைநேர்த்தி செய்யாவிட்டால், ரைசோபியம் 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/எக்டர்) மற்றும் பாக்க்போபாக்டீரியா 10 பாக்கெட் (2000 கிராம்/ஹெக்டர்) உடன் 25 கிலோ கிராம் தொழு உரம் மற்றும் 25 கிலோ கிராம் மணலுடன் கலந்து விதைப்பதற்கு முன்னால் இடவேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை F- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லார் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர்

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சுற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சுற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சுற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லார் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லார் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்கின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை F- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை F- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிபாக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லார் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிபாக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிறுநிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லார் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிபாக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிபாக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சிற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிபாக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர்

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சுற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.
மிளகாய்	1.இலைப்பேன்- இமிடகிலோபிரிட் 17.8% SL 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் அல்லது பைப்ரோனில் 5% SC 0.6 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1.5 மில்லி லிட்டர் வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம்; 2.இலைப்புள்ளி நோய்- காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம்.
கத்திரிக்காய்	1. குருத்து மற்றும் காய்த்துளைப்பான்- அசாடிராக்டின் 1.0 % EC (10000ppm) ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 3 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம், பூச்சிக்கொல்லியை நடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கலாம் அல்லது எமாமெக்டின் பென்சோயேட் 5 % SG 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 4 என்ற வீதம் கலந்து தெளிக்கலாம். 2.சுற்றிலை அல்லது சிறு இலை நோய்- டைமெத்தோயேட் 30 EC ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 1 மில்லி லிட்டர் என்ற வீதம் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கலாம். மேலும் நோய் தாக்கப்பட்ட இலையினை அகற்றி விடலாம்.
தென்னை	தென்னை- சுருள் வடிவ வெள்ளை ஈ- 1. ஏக்கருக்கு என்கார்சீய குவாடலூபே ஒட்டுண்ணிகளை @ 100 வீதம் விடலாம்; 2.ஆமணக்கு எண்ணெய் பூசிய மஞ்சள் நிற ஒட்டு பொறியினை ஏக்கருக்கு 5 வீதம் அமைத்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம்; 3.இளந்தென்னைகளுக்கு ஏக்கருக்கு கிரைசோபர்லா ஜாஸ்ட்ரோவி சில்லம் முட்டைகளை @ 500 வீதம் விடலாம்; 4. காண்டாமிருக வண்டு- ஹெக்டருக்கு 5 ரைனோ லூர் இனக்கவர்ச்சிபொறிகளை அமைக்க வேண்டும்.