



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 11-02-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-02-11 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-02-12	2022-02-13	2022-02-14	2022-02-15	2022-02-16
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
டிமாக்ஸ் (° C)	33.0	33.0	34.0	34.0	35.0
டிமின் (° C)	23.0	23.0	23.0	24.0	24.0
RH I (%)	80	80	80	75	75
RH II (%)	55	55	50	50	50
காற்றின் வேகம் (கிமீ)	12.0	12.0	8.0	8.0	8.0
காற்று இயக்கம் (பட்டம்)	110	110	70	20	320
மேகக்கணி (ஆக்டா)	5	4	2	2	2

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (78.0% & 52.0%), 34.0°C மற்றும் 23.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வானம் தெளிவாக காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (09.02.2022 முதல் 19.02.2022 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (0.17 மி.மீ. லிருந்து 0.58 மி.மீ.)

எஸ்எம்எஸ் ஆலோசனை:

பயிறு வகை பயிர்களில் மகசூலை அதிகரிக்க ஏக்கருக்கு 2 கிலோ பயிறு ஒண்டெர்-யை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் ஓட்டும் திரவம் கலந்து

இலைவழி தெளிப்பு செய்ய வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கருப்பு கிராம்	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் உளுந்து பயிரைத் தாக்கும் மஞ்சள் தேமல் பரவலாக காணப்படுகிறது. இந்நோய் அறிகுறிகள்: இளம் இலைகளில் ஆங்காங்கே மஞ்சள் நிற புள்ளிகள் ஆரம்பத்தில் தோன்றும். புதிதாக தோன்றும் இலைகளில் ஒழுங்கற்ற மஞ்சள் மற்றும் பச்சைத் திட்டுக்கள் மாறி மாறி காணப்படும். புள்ளிகள் அளவு அதிகரித்துத், முடிவில் இலை முழுவதும் மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும். உளுந்து மஞ்சள் சோகை நச்சுயிரி தாக்கப்பட்ட பயிர்களை ஆரம்பத்திலேயே களைய வேண்டும். இந்நோயை கட்டுப்படுத்த டைமெத்தோயேட் 750 ட் மிலி/ஹெக்டர் என்ற அளவில் விதைத்துத் 30 நாள் கழித்துத் தழைத் தெளிப்பு செய்ய வேண்டும்.
நிலக்கடலை	இரவை நிலக்கடலை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் விளைச்சலை அதிகரிக்க ஏக்கருக்கு விதைக்கும் போது 80 கிலோ ஜிப்சம் அடியுரமாகவும், விதைத்த 40 - 45 நாட்களில் 80 கிலோ ஜிப்சம் மேலுரமாகவும் இட வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கத்திரிக்காய்	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் கத்திரி பயிரைத் தாக்கும் செர்கோர் ஸ்போரா இலைப்புள்ளி நோய் பரவலாக காணப்படுகிறது. பசுங்சோகை புள்ளிகள், நீள் வடிவில் (அ) ஒழுங்கற்ற வடிவில், சாம்பல் கலந்த பழுப்பு நிறமாக மாறும். ஸ்போர் வித்துக்கள் புள்ளியின் நடுவில் காணப்படும் நோய் தீவிரமடையும் போது, இலைகள் முதிர்வதற்கு முன் உதிர்ந்துவிடும். இதனால், பழங்களின் விளைச்சல் குறையும். இந்நோயை கட்டுப்படுத்த: பந்த் சாம்ராட் இரகம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியுள்ளது. நோய் எதிர்ப்பு இரகங்களைப் பயிரிடுவதால் இந்த நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு 2 கி(அ) 2.5 கிராம் ஜனிப் /லி தண்ணீரில் கரைத்துத் தெளிக்க வேண்டும்.
தேங்காய்	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	இனப்பெருக்கத்திற்கு தயார் நிலைக்கு இருக்கும் பெட்டை ஆடுகளுக்கு தரமான குட்டிகளை ஈனும் பொருட்டு இனப்பெருக்கத்திற்கு முன் புரதச்சத்தும் மாவுச் சத்தும், தாது உப்பும கலவை கொடுக்க வேண்டும் மற்றும் வைட்டமின் நிறத்தை கலவை கொடுக்க வேண்டும்.