



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்

&

இந்தியவானிலைத் துறை

வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம், கோவை
ஈரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(26.10.2022 முதல் 30.10.2022)



அறிக்கை எண் 085/2022

தேதி 25.10.2022

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 30° செ முதல் 34° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 26° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 16° செ முதல் 20° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 9° செ முதல் 11° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டத் தின் கடந்தவார வானிலை

ஈரோடு மாவட்டத் தின் 21.10.22 முதல் 24.10.22 வரையிலும் பகல்நேர வெப்பநிலை 31° செ முதல் 33° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 23° செ ஆகவும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 45 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சுராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 3-11 கி.மீ் வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

ஈரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்தவார வானிலை (21.10.2022 முதல் 24.10.2022)				தேதி	அடுத்த ஜூந் துநாட்களுக்கான வானிலை முன் நிறிவிப்பு 30.10.2022 - 08.30 வரை				
21/10	22/10	23/10	24/10		நாள் - 1 26/10	நாள் - 2 27/10	நாள் - 3 28/10	நாள் - 4 29/10	நாள் - 5 30/10
35.8	12.7	2.7	0.0	மழை (மி.மீ)	0	0	0	6	10
32	31	32	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	33	33	31	30	30
21	22	23	23	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	19	18	18	19	19
7	6	6	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	3	4	6	6
90	74	84	85	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	80	85
74	45	69	67	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	55	55	70	70
3	8	11	7	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4	4	4	4	4
90	90	230	200	காற்றுவீசம் திசை	340	340	340	50	70

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை ஈரோடு (26.10.2022 முதல் 30.10.2022)

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலான மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். 29.10.22 மற்றும் 30.10.22 ஆகிய தேதியில் இலோசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செ முதல் 33° செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 18° செ முதல் 19° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 85 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 55 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக

வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 4 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை வீசக்கூடும்.

எரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு														
தேதி	அம்மாபெட்	அந்தியூர்	பலானி	பலானிசாகார்	சென்னிமலை	எரோடு	கோபி	கொடுமுடி	மெட்க்குறிச்சி	நம்பியூர்	பெருந்துறை	சத்தியமங்கலம்	தாளவாடு	ஒள்பாளையம்
26-10-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27-10-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28-10-2022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
29-10-2022	0.0	1.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.4	0.3	6.1	2.0
30-10-2022	6.6	4.8	3.4	0.0	6.6	4.1	2.6	1.3	2.6	3.6	7.8	0.0	4.5	2.1

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வறண்ட (அ) தூறல் மழையுடன் காற்றின் வேகம் 4 - 6 கி.மீ வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு மண் ஈரத்தினைப் பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும். தூறல் மழை மட்டுமே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் மழையில்லா நேரங்களில் உரமிடல் மற்றும் மருந்து தெளித்தலை மேற்கொள்ளலாம்.
நெல்	விதைப்பு, வளர் மற்றும் பூக்கும் பருவம்	மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலைசுருட்டுப்புழுக்களின் தாக்குதல் தென்படுவதால் ஒரு எக்டருக்கு 50 கிராம் பிப்ரோனில் மருந்தினைத் தெளிக்க வேண்டும். நிலவும் வானிலையால் நெல்லில் பேக்ஸியா இலைக்கருகல் நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் இதை கண்காணித்து தேவைப்பட்டால் ஒரு எக்டருக்கு காப்பர் ஷஹ்டராக்ஸெஸ் 1250 கிராம் (அ) ஸ்டெரெப்டோமைசின் சல்பேட் + டெட்ராசைக்கிளின் கலந்த கலவை 300 கிராமுடன் காப்பர் ஆக்ஸிக்ரோனாரை 1250 கிராம் கலந்து தெளிக்கவும். சம்பா நெற்பயிர் தூர்பிடிக்கும் தருணத்தில் இருப்பதால், எக்டருக்கு 38 கிலோ தழைச்ததை மேலுரமாக இடவும்.
மக்காச்சோளம்	வளர்ப்பருவம்	25 நாட்கள் வயதுடைய இறைவை மக்காச்சோள பயிருக்கு எக்டருக்கு 68 கிலோ தழைச்ததை மேலுரமாக இடவும். மண் ஈரத்தினைப் பொறுத்து நீர்பாசனம் செய்ய வேண்டும்.
பயறு	வளர்	கடந்த வாரம் வரையிலான தொடர் மழையினால் இறைவையில் விதைக்கப்பட்ட பச்சைப்பயறு மற்றும் உளுந்து பயிர்களில் மண்ணிலுள்ள அதிக ஈரத்தன்மையால் கிளைகள் வளர வாய்ப்புள்ளது. கிளைகளை வெட்டி விடவும்.
பருத்தி	விதைப்பு	கடந்த வாரம் வரையிலான தொடர் மழையினால் பருத்தியில் இலை சிவப்பு ஆவதை தடுப்பதற்கு வறண்ட வானிலையில் 5 சத மாங்கிசீயம் சல்பேட், யூரியா 1 சதம் மற்றும் சின்சல்பேட் 0.1 சதம் கலந்து பருத்தி விதைத்த 50 மற்றும் 80-வது நாள் தெளிக்கவும். வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் இறைவை குளிர்கால கம்போடியா பருத்திக்கு எக்டருக்கு 40 கிலோ தழைச்தது மற்றும் 40 கிலோ சாம்பல்சத்தும் இடவும், தொடர்ந்து மண்

		அணைக்கவும்.
--	--	-------------

மாமரம்		கடந்த வாரம் வரையிலான தொடர் மழையினால் மாமரத்தின் அதிக தழை வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த 1 சதம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அல்லது பேக்குளோபூட்டர்சேல் என்ற மருந்தை ஒரு மரத்திற்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
வாழை		கடந்த வார வானிலை காரணமாக, வாழையில் சிக்காடாகோ இலைப்புள்ளி நோய் தென்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனை கண்காணித்து லிட்டருக்கு 1 கிராம் கார்பன்டசிம் (அல்லது) 2 கிராம் மான்கோசெப் மருந்தை 0.5 மில்லி ஷப்பாலுடன் கலந்து தெளிக்கவும்.
கொடி வகை காய்கறிகள்	பூக்கும் பருவம்	கடந்த வாரம் வரையிலான தொடர் மழையினால் பூக்கும் பருவத்தில் உள்ள கொடி வகை காய்கறிகளில் அதிக தழை வளர்ச்சி காணப்படும். இதனால் பூ பிடித்தலை அதிகரிக்க எத்திரல் என்ற வளர்ச்சி ஊக்கியை பீர்க்கங்காய் தவிர மற்ற எல்லா கொடி வகைப் பயிர்களுக்கும் தெளிக்கவும். இதை இரண்டு முறை ஒரு வார இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மஞ்சள்	விதைப்பு மற்றும் வளர்ப்பு பருவம்	நிலவும் வானிலையால் மஞ்சளில் இலைக்கருகல் நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே இதை கட்டுப்படுத்த அசாக்ஸிட்ரோபின் என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 1 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்கவும்.
கால்நடைகள்		மழை காலங்களில் கோமாரி நோய் தாக்க வாய்ப்புள்ளதால் அதற்கு தடுப்புசி போடவும். நீரினால் ஏற்படும் நோய்களை தவிர்க்க கால்நடைகள் வெளியில் தேங்கியுள்ள தண்ணீர் அருந்துவதை தவிர்த்து போதிய அளவு சுத்தமான குடிநீரினை கால்நடைகளுக்கு வழங்கவும்.

குறுஞ் செய்தி

- கடந்த வாரம் வரையிலான தொடர் மழையினால் மாமரத்தில் அதிக தழை வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த 1 சதம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் தெளிக்க வேண்டும்.

முதன் மைஅலுவலர் (GKMS)
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சிமையை
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை