பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,
காரைக்கால் & இந்திய வானிலைத்துறை

காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(29.10.2022 முதல் 02.11.2022 வரை)

தொ. எண் (அலுவலகம்): 04368 – 261182
E-mail: agronaas2012@gmail.com தொ. நகல் (அலுவலகம்): 04368-261260

அறிக்கை எண்: 086 (10) PJN/GKMS/2022 தேதி: 28.10.2022

காரைக்கால் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (23.10.2022 முதல் 27.10.2022 வரை)					வானிலை காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு -02.11.2022 – 8.30 மணி நேரம் வரை				
23/10	24/10	25/10	26/10	27/10		நாள்-1 29/10	நாள்-2 30/10	நாள்-3 31/10	நாள்-4 01/11	நாள்-5 02/11
22.5	0	0	0	0	மழை (மி.மீ)	3	15	4	8	25
31	31	34	34	34	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	31	30	31	30	30
24	26	24	24	23	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (டி.செ)	24	23	23	23	22
4	5	4	2	2	மேக மூட்டம்	8	8	8	8	8
69-88	68-92	62-88	62-85	52-80	ஈரப்பதம் (%)	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
3	2	1	1	2	காற்றின் வேகம் (கி.மீ)	10	12	12	12	10
வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	மேற்கு வட மேற்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	காற்றின் திசை	வடக்கு வட கிழக்கு	வடக்கு வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	கிழக்கு	கிழக்கு

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (29.10.2022 முதல் 02.11.2022 வரை):

- அக்டோபர் 29 லிருந்து நவம்பர் 02 வரை அநேக இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழையும்
- அக்டோபர் 30, 31 மற்றும் நவம்பர் 02 தேதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- அக்டோபர் 29லிருந்து நவம்பர் 02வரை இடியுடன் மின்னல் ஓரிரு இடங்களில் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். வெப்ப நிலை 22-31 டி.செ, மாலை மற்றும் காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 60-90 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10-12 கி.மீ அளவுக்கு பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. காற்றானது பெரும்பாலும் வடக்கு வட கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுறை

பயிர்கள்/ கால்நடைகள்	நிலைகள் / விவரங்கள்	வேளாண் ஆலோசனைகள்
நெல்	தூர் கட்டும் பருவம்	→ நெற் பயிரில் இலை சுருட்டுப் புழுக்களை கட்டுப்படுத்த டிரைக்கோகிரம்மா கைலோனிஸ் ஒட்டுண்ணிகளை 5cc (ஹெக்டேருக்கு 1,00,000) என்ற அளவில் 37, 44, 54 ஆகிய நாட்களில் வெளியிடலாம். → தழைச்சத்துக்களை தேவையில்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக படுத்துவத்தை தவிர்க்கவேண்டும். → விளக்குப் பொறியை பயன்படுத்தி அந்து பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம். நடவுவயலில் டி(T) வடிவ குச்சிகளை வைத்து பூச்சிகளை உண்ணும் பறவைகளை பயன்படுத்தி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது கார்டேப்ஹைட்ரோகுளோரைடு (cartaphydrochloride 50% SP) லிட்டருக்கு 2 கிராம் அல்லது ஃப்ளுபென்டையமைடு (flubendiamide 20 WG) லிட்டருக்கு 0.25 கிராம் அல்லது தையமீதாக்சம் (thiamethoxam 25 WG) லிட்டருக்கு 0.2 கிராம் என்ற அளவில் தெளிக்கலாம்.
கால்நடை	தடுப்பூசி செலுத்துதல்	தற்பொழுது நிலவும் வானிலை சூழலானது கோமாரி நோய் வருவதற்கு ஏற்புடையதாய் இருப்பதால் தங்கள் கால்நடைகளுக்கு கோமாரி தடுப்பூசி போடுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

குறுஞ்செய்தி: அடுத்த சில நாட்களுக்கு லேசான முதல் கன மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அனைத்து பயிர்களுக்கும் வடிகால் வசதி அளிக்கவும்.

முதல்வர்