



கிராமின் கிருஷி ம அச சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	32.0	33.0	31.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	21.0	21.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	80	84	85	92
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	47	43	49	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4.0	6.0	4.0	4.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	109	93	258	249	215
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	78	76	84	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	39	35	49	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	104	103	302	335	264
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம அச சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	78	76	84	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	39	35	49	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	97	92	305	334	260
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	22.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	78	77	83	84	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	42	38	49	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	93	106	271	304	249
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	23.0	22.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	76	85	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	39	35	50	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	77	67	308	340	256
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம அச சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	33.0	31.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	21.0	21.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	80	84	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	39	36	49	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	98	93	287	285	235
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	1	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	81	84	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	40	39	36	49	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	106	104	291	299	244
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	77	75	84	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	39	35	48	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	124	127	301	333	270
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	31.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	76	80	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	39	36	49	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	123	119	293	287	228
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	1	1	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (83.0% & 45.0%), 32.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	35.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	23.0	23.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	76	85	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	43	39	35	50	53
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	81	74	305	339	257
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 46.0%), 32.0°C மற்றும் 21.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம அச சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொடடியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	33.0	31.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	21.0	21.0	21.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	80	84	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	39	36	49	52
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	97	90	287	281	231
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	1	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (81.0% & 42.0%), 33.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	32.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	22.0	22.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	75	82	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	39	38	34	46	54
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	183	184	307	313	272
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	1	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (83.0% & 45.0%), 32.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு
- அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	34.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	22.0	21.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	76	80	85	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	38	35	47	54
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	161	159	301	296	245
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	2	1	3	3

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (81.0% & 42.0%), 33.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 6.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து. 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 25-10-2022

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-25 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை
செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	2022-10-29	2022-10-30
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33.0	33.0	33.0	31.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	79	78	83	84	91
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	42	44	39	49	51
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4.0	6.0	5.0	5.0	6.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	98	100	266	281	237
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	2	2	3	4

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மட்டும் மிதமான மழைத்தூறல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (83.0% & 45.0%), 32.0°C மற்றும் 22.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 20.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (26.10.2022 முதல் 01.11.2022 வரை) சராசரியாக மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.44 மி.மீ. லிருந்து 5.07 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி:

வரும் நாட்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிப்பதினை தவிர்க்கவும். மழை பொழியாத நாட்களில் தெளிப்பது நன்று.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	தற்போது பெய்துள்ள மழை மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி நெல் நடவு நடட்ட மூன்றிலிருந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு 350 கிலோ என்ற அளவில் அசோலாவை பரவலாக தூவி நெற்பயிருடன் வளர வேண்டும். அசோலா வளர்ச்சியடைந்த நிலையில் களை எடுக்கும் தருணத்தில் காலால மண்ணிற்குள் மிதித்து விடுதல் வேண்டும் மேலும் 10 கிலோ நீலப்பச்சை பாசியின் விதையை நடவு செய்த 10 நாளில் தூவி சீரான அளவு தண்ணீர் கட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.
நெல்	நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மழை பயன்படுத்தி நஞ்சையில் புழுதி விதைத்த மானாவாரி நெல் உர மேலாண்மை செய்வதற்கான ஏற்ற தருணமாகும். விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பொதுவான உர அளவாகிய 50 கிலோ தழைச்சத்து, 25 கிலோ மணிச்சத்து, 25 கிலோ சாம்பல் சத்துக்களை இடவேண்டும் மேலும் தழைச்சத்து 25 கிலோ சாம்பல் சத்து உரத்தினை 12.5 கிலோ வீதம் பயிர் முளைத்து 20-25 நாட்களில் முதலிலும் மீண்டும் 40-45 ஆம் நாட்கள் மறுமுறை இடவேண்டும்.
மக்காச்சோளம்	மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழுவின் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் புழுக்கள் இலையுறைக்கும், தண்டிற்கும் இடையே குடைந்து சென்று நடுக் குருத்தை தாக்குகிறது. இதனால் நடுக்குருத்து அழுகிவிடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறி வைக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 10 என்ற எண்ணிக்கையில் பறவை தாங்கிகளை அமைக்க வேண்டும். மேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 70கிராம் அல்லது 70மில்லி என்ற அளவில் மெட்டாரைசியம் அல்லது பெவேரியா பேசியானா இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 50கிராம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அதனுடன் 10மில்லி ஒட்டுபசை கலந்து குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும் படி தெளிக்கவும். ரசாயண முறையில் இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்ததிலிருந்து 12வது நாள், 10 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10 கிராம் இமாமெக்டின் பென்சோயேட் மற்றும் 25மில்லி. பெர்மெத்ரின் உடன் ஒட்டும்பசை கலந்து பயிர்களின் குருத்துப் பகுதி நன்கு நனையும்படி மழை இல்லாத நாட்களில் தெளிக்கவும்.

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பருத்தி	<p>தற்போது நிலவி வரும் தட்பவெப்ப சூழ்நிலையில் அடிக்கடி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பருத்தியில் வேர் அழுகல் நோய் ஆங்காங்கே தென்படுகிறது. எனவே, இதை தவிர்க்க வயலில் நன்கு வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் + டிரைக்கோடெர்மா விரிடி 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும். அல்லது ஊடுருவி பாயக்கூடிய இராசாயண பூச்சிக்கொல்லியான கார்பெண்டாசிம் 1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேரில் ஊற்றவும். இவ்வாறு செய்வதால் பருத்தியை மழையில் இருந்து வேர் அழுகல் வராமல் காப்பாற்ற முடியும்.</p>