



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	12.0	13.0	17.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	215	220	210	223
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	66	70	66
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12.0	13.0	14.0	17.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	218	222	211	224
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	69	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	12.0	13.0	16.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	238	219	223	213	226
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஓட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஓட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் ஆவுடையார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	66	70	66
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12.0	14.0	15.0	17.0	14.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	234	219	223	212	225
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 12 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஓட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஓட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	36.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	69	64	68	70	69
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	46	44	47	46
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	14.0	13.0	16.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	231	223	227	209	224
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	36.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	69	65	66	70	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	45	43	46	45
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	13.0	13.0	16.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	222	226	212	225
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	36.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	27.0	27.0	26.0	27.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	66	65	69	66
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	43	41	44	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9.0	12.0	12.0	12.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	246	230	235	223	236
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.0°C - 27.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 09 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஓட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஓட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	12.0	13.0	17.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	216	220	211	223
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	11.0	13.0	17.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	214	218	209	221
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	47	44	42	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	11.0	13.0	17.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	213	218	209	221
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 17 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	69	65	65	70	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	43	41	45	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	11.0	13.0	14.0	16.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	236	220	224	213	226
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11 - 16 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	37.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	27.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	68	65	66	70	66
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	46	44	42	45	45
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	13.0	14.0	15.0	18.0	14.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	233	221	223	212	225
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	7	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C - 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 13 - 18 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 06-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-06 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	36.0	36.0	35.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	27.0	27.0	26.0	27.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	66	65	69	65
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	44	43	41	44	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9.0	12.0	12.0	12.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	247	232	236	225	237
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	8	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 35.0°C - 36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 26.0°C - 27.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 09 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

வானிலை மாற்றம் காரணமாக கால்நடைகளில் புற ஒட்டுண்ணியின் தாக்கம் காணப்படுவதால் இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஊறவைத்த வசம்பு கலவை அல்லது ஒட்டுண்ணி நீக்க சைபர் மெத்திரன் 1 % கொண்டு தூய்மை படுத்தலாம் .

குறுஞ்செய்தி :

மழை குறைவாக இருப்பதினால் பூ பூக்கும் பருவத்தில் இருக்கும் பயிர்களுக்கு காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் மட்டும் நீர்ப்பாசனம் செய்யவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் பயிர் முளைத்த 3-4 தினங்களுக்குள் ஏக்கருக்கு பெண்டிமெத்திலின் 1 லிட்டர் அல்லது பிரிட்டிலாகுளோர் +சேப்னர் (சோ பிட்) 500 மில்லி என்ற அளவில் விதை முளைக்கப் போதுமான மழை பெய்த உடனேயே தெளித்துக் களையைக் கட்டுப்படுத்தலாம் .
நெல்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை க்கு வாய்ப்புள்ளது. குறுவை பருவ நெல்லை அறுவடை செய்ய உகந்த காலமாகும் . அறுவடை செய்த நெல்மணிகளை உலர்வான இடங்களில் சேமிக்கவும் .

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	கடந்த வாரம் ஒரு சில இடங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்த காரணத்தால் தக்காளியில் வேரழுகல் நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது .இதனை கட்டுப்படுத்த காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு என்ற மருந்தை 1லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2.5 கிராம் வீதம் கலந்து ஊற்ற வேண்டும் .
மாம்பழம்	மா மரத்தில் கவாத்து செய்வதற்கு ஏற்ற தருணமாகும் . வருடத்திற்கு ஒரு முறை செப்டம்பர் மாதங்களில் நெருக்கமாக உள்ள கிளைகளை வெட்டிவிட்டு ஆரோக்கியமாக உள்ள கிளைகளை மட்டும் வளர்க்க வேண்டும் இதன் மூலம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் காற்று உள்ளே உள்ள கிளைகளுக்கு கிடைக்கிறது .மரம் நன்றாக வளர்ந்து பூ பூத்து காய்ப்பிடிப்புக்க ஏதுவாகிறது .
வாழை	தற்போது வாழை சாகுபடி செய்து இருக்கும் விவசாயிகள் ஏக்கருக்கு 8 கிலோ தட்டை பயிர் ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்து 50 % பூக்கும் தருணத்தில் மடக்கி மண்ணில் உடும்போது மண் வளம் மேம்படும் களைகள் கட்டுப்படும் மழை நீர் சேமிக்கப்படும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வெள்ளாடு	பொதுவாக மழை காலங்களில் மேய்ச்சல் நிலங்களில் குடற்புழுக்களின் நோய் உண்டாக்கும் இளநிலை பருவ புழுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதால் குறிப்பாக செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளில் உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் .அதனால் ஆடுகளுக்கு சாண பரிசோதனை செய்து உருளை புழுக்களின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தால் குடற்புழு நீக்கம் செய்யலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் கோழி வளர்க்கும் விவசாயிகள் இரத்த கழிச்சல் நோய் ஏற்படாமல் தடுக்க ஆழ்கூளம் சுத்தமாகவும், ஈரப்பதம் இல்லாமலும் சுத்தமான குடிநீர் கோழிகளுக்கு கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	மண் வளத்தை மேம்படுத்தி அதிக மகசூல் பெற ஏக்கருக்கு 20 கிலோ சணப்பை அல்லது தக்கைப்பூண்டு அல்லது நவதானியங்கள் பூக்கும் முன் 30 -40 நாட்களில் மடக்கி உழ வேண்டும் .