



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அரிமளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	29.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	71	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	6.0	6.0	9.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	154	167	288	277	289
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28.0°C- 29.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 07 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அறந்தாங்கி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	29.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	73	70	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	7.0	7.0	10.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	161	176	281	274	284
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 07 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் அன்னவாசல் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	73	70	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	37	40	42	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	7.0	7.0	10.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	167	182	287	278	288
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 07 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூளளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் ஆவுடையார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	73	70	70	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	7.0	7.0	10.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	163	179	276	271	280
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 07 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்களையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கந்தர்வகோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	74	75	71	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	39	41	42	40	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	8.0	12.0	13.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	190	226	259	276	280
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C- 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 13 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

பதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் கறம்பக்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	72	73	70	69
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	42	39	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	8.0	11.0	12.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	181	205	272	276	283
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36.0°C - 37.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27.0°C- 28.0°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08 - 12 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும்.</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் குன்னாண்டார்கோயில் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	69	71	68	68
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	34	38	39	38	35
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	9.0	9.0	13.0	14.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	214	231	281	279	284
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 14 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூளளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருமயம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	29.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	73	71	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	154	167	287	277	288
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28°C-29°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் திருவரங்குளம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட : 2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	29.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	71	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	6.0	6.0	9.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	149	161	291	279	291
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28°C-29°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 6 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூளளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் புதுக்கோட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	29.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	71	71	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	41	43	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	6.0	6.0	9.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	147	159	292	279	292
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28°C - 29°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 6 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் பொன்னமராவதி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	70	70	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	37	40	42	39	36
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7.0	7.0	7.0	10.0	10.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	160	176	282	274	283
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் மணல்மேல்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	70	70	68	67
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	39	41	43	40	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	170	187	271	269	276
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 28°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 8 - 11 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூளளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா

இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட்
ஆலோசனை புல்லட்டின்
(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-09-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) இல் விராலிமலை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2022-09-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-09-17	2022-09-18	2022-09-19	2022-09-20	2022-09-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37.0	37.0	36.0	36.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	69	71	68	68
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	34	37	39	37	35
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	10.0	10.0	14.0	14.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	217	234	281	278	283
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	5	6	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் மழை இராது . அதிகபட்ச வெப்ப நிலை 36°C - 37°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்ப நிலை 27°C. வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 7 - 10 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

மழை முன்னறிவிப்பு : செப்டம்பர் 19 முதல் 21 வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இயல்பானது மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது . அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பானது இருக்கும்.

குறுஞ்செய்தி :

காய்கறிகள் விதைக்கும் பருவமாதலால் விவசாயிகள் 1 கிலோ விதையுடன் 4 கிராம் பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைத்து நாற்றமூகல் நோய் வராமல் தவிர்க்கலாம்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------	--------------------------

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	தற்போது நிலவும் பருவ சூழ்நிலையில் புரட்டாசி பட்டத்தில் பயறு வகை பயிர்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் அதிக மகசூல் கொடுக்கக்கூடிய உளுந்து ராகம் வம்பன் 8 மற்றும் வம்பன் 10, பச்சை பயிறு வம்பன் 3 மற்றும் 4 ஆகிய ரகங்கள் இரங்களை தேர்வு செய்து விதைக்கவும் . விதைக்கும் முன் உளுந்தில் வேர் அழுகல் நோய் வராமல் தடுக்க விதையை டிரைகோடெர்மா விரிடி 4 கிராம்/கிலோ (அ) சூடோமோனாஸ் 10 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.
நெல்	கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பெய்து உள்ளதால் நெல் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம். சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நெற்பயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு செய்ய வேண்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுக்களை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு செய்வதே சிறந்ததாகும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் காண்டாமிருக வண்டினை கட்டுப்படுத்த ஒரு மண் பானையில் 5 நீருடன் 1 கிலோ ஆமணக்கு புண்ணாக்கு சேர்ந்த கலவை தோப்பில் வைத்து கவர்ந்து அழிக்கலாம் . வேப்பங்கொட்டை தூள்ளையும், மணலையும் 1.2 என்கிற விகிதத்தில் கலந்து மரம் ஒன்றுக்கு 150 கிராம் விகிதம் நாடு குருத்தின் 3 மட்டை இடுக்கில் வைக்கவும் .
வாழை	தற்போது புரட்சி பட்டம் வாழை சாகுபடி செய்யவுள்ள விவசாயிகள் களையை கட்டுப்படுத்த இரத்தன்மை தக்க வைக்க வாழை நடவு செய்யும் போது இடையே உள்ள இடைவெளியில் தட்டைப் பயிரை ஊடுபயிராக பயிர் செய்ய வேண்டும் .
தக்காளி	தக்காளி பயிரில் தேமல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோயின் அறிகுறியாக தாவரத்தில் வெளிர், பச்சை புள்ளி அமைப்புடனும் மேலும் இளம் இலைகள் வெயில் நாட்களில் வாடத் தொடங்கும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரம் வளர்ச்சி குன்றி வெளிர் பச்சை நிறமாக காணப்படும். விதைகளை விதைப்பதற்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 90கி டிரைசோடியம் பாஸ்பேட் கரைசலில் ஊற வைப்பதன் மூலம் நோயைக் குறைக்கலாம். விதைகளை நன்கு அலசி நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட தாவரங்களை கவனமாக அகற்றி அழித்து விட வேண்டும். வைரஸ்நோய் தொற்று கொண்ட நாற்றுக்களை நடவிற்கு பயன்படுத்த கூடாது. புகையிலை, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய், குடைமிளகாய், கத்தரி போன்றவற்றை தவிர மற்ற பயிர்களை பயிர் சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	ஒரு நாளைக்கு 10 லிட்டர் பால் தரக்கூடிய கறவை மாட்டிற்கு 14 சென்டில் அதாவது கம்பு நேப்பியர் கோ (பிஎன் 5) ஒட்டுப்புல்லை 9 சென்டிலும் (வேலிமசால் கோ 2) 5 சென்டிலும் பயிரிடுவதான் மூலம் மேம்பட்டபால் உற்பத்தியினை பெறலாம் .

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மழைக் காலங்களில் மழையும் இடையே ,இடையே வெயிலும் நிலவுதால் ஈக்களின் பெருக்கத்திற்கு மிகவும் உகந்த சூழ்நிலை இருக்கும். அதனால் ஈக்கள் வெகுவாக கோழி மற்றும் கால்நடை பண்ணைகளில் வரும் மாதங்களில் அதிக தொல்லையை ஏற்படுத்தும். ஈக்களை தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . மேலும் பண்ணை சுகாதாரத்திற்கு முக்கியதுவம் அளிக்க வேண்டும் .</p>