



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	23/08/2023	மாதல்	27/08/2023
அறிக்கை எண் :	067/ 2023	வளையீட்டு நாள் :	22/08/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது.

கடந்தவார வானிலை (17.08.2023 மாதல் 21.08.2023)					அட்த்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றறிவிப்பு -27-08-2023- 08.30 வரலை					
17/08	18/08	19/08	20/08	21/08	ததே	நாள்-1 23/08	நாள்-2 24/08	நாள்-3 25/08	நாள்-4 26/08	நாள்-5 27/08
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	மழலை (மி.மீ)	5	3	0	0	0
37	39	38	39	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	39	38	38	37	37
25	25	25	25	26	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலலை (சலை)	27	26	26	25	25
3	5	4	3	3	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	7	6	6	5
71	66	62	57	57	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	70	70	70	70
37	44	40	42	39	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	12	14	18	16
7	10	13	8	7	காற்றின் திசலை	தறெகா	தறெகா	தறெகா	தறெகா	தறெகா
தன் கிழக்க	வட மறெக	வட மறெக	வட கிழக்க	வட கிழக்க	காற்றின் திசலை	தறெகா	தறெகா	தறெகா	தறெகா	தறெகா

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 24 ததே லசோன மழலைகா வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 25°-27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கா 12 மாதல் 18 கி.மீ வகேத்தில், தறெகா திசையிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

அட்த்த 5 நாட்களுக்கா மணிக்கா 12 மாதல் 18 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரம்பா, வாழலை, பப்பாளி, கபாய்யா, மாராங்கலை போன்ற பயிர்களுக்கா மண் அனலைத்தல், மூட்டகொட்த்தல், விட்டம் கட்டுதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கலை மறெக்கொள்ளவும். கபொடிவகலை பயிர்களில் பந்தல்களில் தாராபிடித்து பழுதடலைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் துண்கலை கண்டறிந்து சரி சயெய்வாம்

ஒத்திவகைக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரூ இடங்களில் ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 24ம் ததேதி இடி மின்னலுடன கூடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழகைகூ வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆட்களன கிடன அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின பதோது பதோதிய பாதுகாப்பு நடவடிககைகளன மறேககளள்ளவம். இந்த காலகட்டத்தில கால்நடகைளன மயேச்சலுக்கூ வளனியதே அனுப்பாமல், மின்கம்பப மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக ககொட்டககைளில் கட்டி வகைகூப படியம் கதேட்ககளள்ளப்புகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளோண் ஆலசோனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : நலெல், தக்காளி, கால்நடன

நலெல்:

ஆவனனி, பாரட்டாசி பட்டத்தில் நலெல் நடவா சயெய்வாள்ள விவசாயிகளள் ஏக்கரூக்கூ 20 கிலலோ சணப்பன அல்லது தக்ககை பூண்டூ அல்லது நடவதாணியம் ககொண்டூ விததைத்து அவன வளர்ந்து 30 - 45 நாட்களூக்கூ அவ்வயலில் அப்படியதே மடக்கி விட்டூ நலெல் நடவா சயெய்மாறூ அறிவூறுத்தப்புகிறார்கள்.

சிறிதளவூ காரத் தன்மயைள்ள தண்ணீர் மற்றும் மண்ணிறகூ தக்ககை பூண்டன ததேர்வூ சயெய்வது நல்லது.

தக்காளி:

தக்காளியில் சபெட்டரூரியா இலபைப்பூள்ளி நூயின தூக்கூதல் பரவலாக தனென்புகின்றது. இந்நூயானது தக்காளி சபெடியின எந்த வளர்ச்சி நிலயைலும் பாதிப்பன ஏற்படூத்தலாம். இதன் அறிகூறியாக சிறிய சாம்பல் நிற, வட்ட இலபை பூள்ளிகளள் காணப்படும். பாதிக்கப்பட்ட தாவர பகூதிகளன நீக்கி அழித்து விட வணேடும்.

ஏக்கரூக்கூ 350கிராம் என்ற அளவில் காப்பர் ஆக்சி காளூரடனூ மரூந்தினன நீரில் கலந்து தனெிப்பதன் மூலமாகவூம் இந்நூயன கட்டூப்படூத்தலாம்.

கால்நடன:

விவசாயிகளள் தங்களது பசூ மாடூகளூக்கூ பசூந்தீவனம் மற்றும் வகைக்கூலன காலயைில் பாதியளவூம் மாலயைில் பாதியளவூம், பால் கறந்த பின்பூ அளிக்க வணேடும்.

தீவனங்களயைம், தீவன அளவயைம் திடீர் என்று மாற்றூதல் கூடாதூ. சிறிதூ சிறிதாக மாறூதல் சயெய்தல் வணேடும். நீளமான மற்றும் கடினமான தண்டூகளூடயை தீவனங்களன பூல்வடெட்டி ககொண்டூ சிறூ தூண்டூகளாக வடெட்டிப் பதூட வணேடும்.

இளம் தழன மற்றும் பூற்களன உலர்த்தி வகைக்கூலூடன் கலந்து அளித்தல் நல்லது.

பதன பூற்களன (சலைஜே) பால் கறவன மூடிந்த பிறகூம் அடர் தீவனத்தன சரிபாதியாக காலன மற்றும் மாலயைிலும் அளிக்க வணேடும்.