



தமிழ்நாடுவேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்
&
இந்தியவானிலைத் துறை
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சிமையம், கோவை
திருப்பூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை
(04.02.2023 முதல் 08.02.2023)



அறிக்கை எண் 0010/2023

தேதி 3.02.2023

மாநிலத் தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 29° செ முதல் 35° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 21° செ முதல் 25° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 15° செ முதல் 20° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 08° செ முதல் 11° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் மழை பெறப்படவில்லை.

திருப்பூர் மாவட்டத் தின் கடந்தவார வானிலை

திருப்பூர் மாவட்டத் தின் 31.01.23 முதல் 2.02.23 வரையிலும் பகல்நேர வெப்பநிலை 30° செ முதல் 33° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 19° செ முதல் 22° செ ஆகவும் காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 86 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 28 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 11-12 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

திருப்பூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்தவார வானிலை (31.01.2023 முதல் 02.02.2023)			தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன் ஏறிவிப்பு 08.02.2023- 08.30 வரை				
31/01	01/02	02/02		நாள்-1 04/02	நாள்-2 05/02	நாள்-3 06/02	நாள்-4 07/02	நாள்-5 08/02
0.1	0.0	0.0	மழை (மி.மீ)	20	15	0	0	8
30	32	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	30	30	31	31	31
22	19	22	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	21	21	20	20	20
7	6	7	மேக மூட்டம் (ஆக்டர்)	7	7	6	6	6
86	72	48	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	86	70	70	85
44	28	40	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	45	45	45
11	11	12	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	12	12	10	10	12
70	90	70	காற்றுவீசும் திசை	70	70	90	90	90

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை திருப்பூர் (04.02.2023 முதல் 08.02.2023)

வரும் நாட்களில் வானம் பெரும்பாலான மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் இலேசான தூறல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செ முதல் 31° செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20° செ முதல் 21° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 86

சதவிகிதமாகவும், மாஸைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 45 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10-12 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசையிலிருந்து தென்கிழக்கு திசைவரை வீசக்கட்டும்.

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	அளினாசி	தூராபுரம்	குழமங்கலம்	காந்தேகம்	குண்ட்டம்	மட்டத்துக்குளம்	மூலதூர்	பங்கலம்	பெங்கலூர்	திருப்பூர்	உடுமணவப்பெட்டி	ஊத்துக்குளி	கெள்ளக்கோவில்
04-02-2023	16	14	15	13	15	16	13	16	16	17	16	16	11
05-02-2023	11	6	7	7	8	6	4	10	10	12	6	11	3
06-02-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-02-2023	5	3	3	3	3	3	2	4	4	5	3	5	1

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		<p>அடுத்த 5 நாட்களுக்கு குளிர்ந்த வறண்ட வானிலையுடன், காற்றின் வேகம் 10 - 12 கி.மீ வரை எதிர்பார்க்கப்படுபிற்கு. ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது.</p> <p>வறண்ட வானிலை தொடர்வதால், மண் ஈரத்தினைப்பொறுத்து மாஸையில் நீர் பாசனம் செய்யவேண்டும். பயிர்கழிவு மூடாக்கு இடுவதால் மண் ஈரத்தினைப் பாதுகாக்கலாம்.</p> <p>அறுவடை முடிந்த பிறகு நிலத்தினை கொத்து அல்லது சட்டிக் கலப்பை கொண்டு உடனடியாக உழுவதன் மூலம் கணைகளை கட்டுப்படுத்துவதுடன் கோடை கால மழையின் ஈரப்பத்தை சேகரிக்கலாம்.</p> <p>வறண்ட வானிலையே எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அறுவடை செய்த தானியங்களை காயவைத்து தக்க முறையில் சேமிக்கவும்.</p>
நெல்	நடவு மற்றும் பால்பிடிக்கும் பருவம் பருவம்	<p>நீர்ப்பாசனம் உள்ள இடங்களில் நவரை பருவ நெல் நடவினை நீர் மறைய நீர்கட்டு முறையுடன் மேற்கொள்ளவும்.</p> <p>சம்பா நெல் பயிரில் தற்போது நிலவும் வானிலையால் கதிர் நாவாய் பூச்சி வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே தாக்குதல் தென்பட்டால் டைகுளோர்வாஸ் என்ற மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு 2 மில்லி லீடர் தெளிக்கவும்.</p>
கரும்பு	நடவு	வறண்ட வானிலை நிலவுவதால் கரும்பில் இளங்குருத்து புழு வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் அடிக்கடி தண்ணீர் பாய்ச்சி வயலை நன்கு ஈரமாக வைத்துக்கொள்வதன் மூலம் இந்த தாக்குதலை குறைக்கலாம். மேலும் பயிர் மூடாக்கு செய்வதன் மூலமும் இந்த

		தாக்குதல் குறைவதோடு மட்டும் அல்லாமல் நீர் தேவையையும் குறைக்கலாம்.
--	--	---

வாழை		மேற்கு வேளாண் மண்டலத்தில் வறண்ட காற்றானது 10 – 12 கி.மீ் வரை வீச வாய்ப்புள்ளதால் 5 மாதங்களுக்கு மேலான வாழை மரங்களுக்கு போதிய முட்டுகளைக்கவேண்டும். வாழையில் சில இடங்களில் வாடல் நோய் காணப்படுகிறது. நோய் அதிகமாக பாதித்திருந்த மரத்தை அகற்றி விட்டு சண்ணாம்பு இடவும். மேலும் வாழைத்தண்டு 45 டிகிரி கொண்டத்தில் 10 செ.மீ் துளை எடுத்து அதில் 60 மி.கிராம் கார்பன்டசிம் மாத்திரை அல்லது கார்பன்டசிம் 2 சத நீரை 3 மில்லி அல்லது 50 மில்லி கிராம் தூடோமோனாஸ் ப்ளோரோசென்ஸ் உயிர் பூஞ்சான கொல்லியை கொண்டு நிரப்பவும். இந்த முறையை 2, 4 மற்றும் 6 வது மாதங்களில் செய்யவும். கரும்பு ஆலை கழிவு ஒரு மாத்திற்கு 5 கிலோ இடுவது தாக்குதலை குறைக்கும்.
கொடி வகை காய்கறி	பூக்கும் பருவம்	பெண் பூக்களை அதிகரிக்க கொடி வகை காய்கறி பயிரில் எத்ரல் 100 பிபிளம் அதாவது 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 1மில்லி கலந்து 15 நாட்கள் இடைவெளியில் நான்கு அல்லது ஐந்து முறை நிலத்தில் போதுமான ஈரம் இருக்கும் பட்டத்தில் தெளிக்கவும்.
தென்னை		தென்னை மரத்தில் தற்போது நிலவும் தூழ்நிலையால் இலைகருகல் நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் மரத்தை நன்கு கண்காணித்து தாக்குதல் காணப்பட்டால் கார்பன்டசிம் என்ற மருந்தை 100 மில்லி தண்ணீருக்க 2 கிராம் என்ற அளவில் கலந்து வேர் மூலம் செலுத்தவும். தென்னையில் வெப்ப நிலை உயர்ந்து வருவதால் கருந்தலைப்புழு வர வாய்ப்புள்ளது. ஆரம்பகாலமாக இருந்தால் ப்ரொக்கானிஸ் என்ற ஒட்டுண்ணியை ஏக்கருக்கு 2100 என்ற அளவில் வைக்க வேண்டும். இந்த ஒட்டுண்ணி தென்னை ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆழியார் நகரில் கிடைக்கிறது. தாக்குதல் அதிகமாக காணப்பட்டால் 10 மில்லி மேனோகுரோட்டோபாஸ் என்ற மருந்தை வேர் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
கால்நடைகள்		தற்போது நிலவும் வானிலையால் கறவை மாடுகளில் மடிவீக்க நோய் பரவ வாய்ப்புள்ளது. எனவே ஒரு சதம் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கரைசலைக் கொண்டு பால் கறப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் மடியை சுத்தம் செய்யவும்.

குறுஞ் செய்தி

- மேற்கு வேளாண் மண்டலத்தில் வறண்ட காற்றானது 10 – 12 கி.மீ் வரை வீச வாய்ப்புள்ளதால் 5 மாதங்களுக்கு மேலான வாழை மரங்களுக்கு போதிய முட்டுகளைக்க வேண்டும்.