



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சின்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	17/06/2023	மாதல்	21/06/2023
அறிக்கை எண் :	048/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	16/06/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரம்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (11.06.2023 மாதல் 15.06.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றறிவிப்பு -21-06-2023- 08.30 வரலை					
11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	ததே	நாள்-1 17/06	நாள்-2 18/06	நாள்-3 19/06	நாள்-4 20/06	நாள்-5 21/06
0.0	0.0	8.6	4.3	0.0	மழை (மி.மீ)	3	6	8	8	6
40	40	40	39	40	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	41	40	39	39	39
26	27	26	26	27	காறந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
3	5	5	3	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	4	8	8	8	6
56	54	67	55	54	அதிக மற்றும் காறந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	80	70
43	49	46	39	43	காற்றின் வெகேம் (கி.மீ/மணி)	30	30	40	50	50
8	8	6	6	8	காற்றின் திசை	8	8	10	6	6
மறேகூ	வட மறேகூ	மறேகூ	மறேகூ	வட மறேகூ	காற்றின் திசை	மறேகூ	வட கிழக்கூ	தறேகூ	வட மறேகூ	தனென் மறேகூ

காறஞ்சயெத்தி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 17, 18, 21 ததே லசோன மழயைம் மற்றும் 19, 20ம் ததே மிதமான மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலயைானது 39°-41° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலயைானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிககூ 6 மாதல் 10 கி.மீ வெகேத்தில், மறேகூ, வடகிழக்கூ, தறேகூ, வடமறேகூ மற்றும் தனென்மறேகூ திசகைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பபொது ஆலோசனலை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பூ வானிலைமான்றறிவிப்பு (16-22 ஜூன் 2023):

மழபைப்பபொழிவு :

மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று கறைவான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 30° செல்சியஸ் மாதல் 34° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

கறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

16-06-2023 - 22-06-2023: மாவட்டத்தில் கறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொதுத்தமட்டில் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

வெப்பஅலை எச்சரிக்கை:

தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு (17.06.2023 & 18.06.2023) அதிகபட்ச வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படும். இதன் காரணமாக சில இடங்களில் வெப்பஅலை வீசக்கூடும். எனவே விவசாயிகள் வயல்வெளி வேலைகளை காலம் மற்றும் மாலம் நேரங்களில் செய்ய திட்டமிடவும். பொதுமான அளவு தண்ணீர் கூடிக்கூடும் படியும் மதிய நேரத்தில் வயலில் வேலை செய்வதைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியும் அறிவாறுத்தப்படுகிறார்கள்.

கால்நடை வளர்ப்போர் பகல் நேரங்களில் 30-60 நிமிட இடவைளியில் 1 மாதல் 5 நிமிடங்களுக்கு விலங்குகளின் உடலில் நேரடியாக தண்ணீரை தெளிப்பதன் மூலம் வெப்ப அழுத்தத்தில் இருந்து விலங்குகளை பாதுகாக்கலாம். மாட்டு கொட்டகையின் பக்கவாட்டில் (ஓரங்களில்) ஈரமான சணல் சாக்குபகைகளை கட்டி விடவும். தாதுக்களக்கான அதிகரித்த தவேயைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வெப்பமான காலநிலையின் பொது விலங்குகளுக்கு அதிகரித்த தாது உப்புச் சேர்க்கையை உறுதி செய்யவும். கால்நடைகளுக்கு காறிப்பாக பொட்டாசியம் நிறைந்த தாதுக்கலவையினை வழங்குவதில் மான்னரிமலை அளிக்க வேண்டாம்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளோண் ஆலகேசனகைள்

மாக்கிய பயிரகைள் : வெண்டலை, மிளகாய், கால்நடை

வெண்டலை:

வெண்டலை பயிரில் தண்டம் மற்றும் காய்ப் பூழுக்களின் தாக்கதல் பரவலாக தென்படுகின்றது. இதன் தாக்கதலால் வெண்டலைச் செடியின் இளங்குரூத்து வாபித் தளொங்கும். மளொக்கு மற்றும் பூக்கள் உதிரந்து விடும் .காய்கள் உரக்காலநந்து காணப்படும்.

மாதலில் தாக்கப்பட்ட காரூத்து, மளொட்டு, பூக்கள் மற்றும் காய்களை சகேரித்து அழிக்க வேண்டாம்.

ஓரூ ஹகெட்ரேக்கு 12 என்ற எண்ணிக்கையில் இனக்கவரச்சி பொறிகளை வதைத்து பூச்சிகளை கவரந்து அழிக்கலாம்.

கொட்டகை கரசைல் இவற்றில் ஏதனும் ஒன்றினை தளெித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

மிளகாய்:

மிளகாய் பயிரில் வரே அழுகல் நளேய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்த நளேயகை கட்டுப்படுத்த, நடவா செய்வதற்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு மான்பு, வபேப் விதபைப் பபொபி @ 0.05கிராம்/கிலளே, வபேப்பிண்ணாக்கு@ 0.15கிராம்/கிலளே மற்றும் பாதினா உரம் @ 0.75கிராம்/கிலளே ஆகியவற்றை கலந்து மண்ணில் இடவணேடும்.

மலேும், தபெுகளேனசளேல் 0.1%, கார்பாக்சின் 0.25% மற்றும் காளளேரளேதலளேனில் 0.20% ஆகிய பூஞ்சகை களெல்லிகளளை கலந்து நடவா செய்த 7 நாட்களில் மண்ணில் (நுனைப்பது) ஊற்றுவதன் மூலம் இந்நளேயகை திறம்பட கட்டுப்படுத்தமாபியம்.

கால்நடை:

தற்பளேது நிலவாம் பரவச்சூழலில் மாடுகளில் சப்பை நளேய்; தாக்குதலுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்நளேய் காற்றின் ஈரப்பதம் கூடதலாகவாம் உள்ள பகாதிகளிலுள்ள மாடுகளபைப் பரெம்பாலும் பாதிக்கிறது. இதுவாம் ஓர் மழகைகால நளேயாகாம். நல்ல ஆரளேக்கியமான திடமான இளம் மாடுகளளை 6 மாத வயது மாதல் 3 ஆண்டு வயது வரளை அதிகம் பாதிக்கிறது. தளெடளை அல்லது மான்கால் சப்பை அல்லது கழுத்து பளேன்ற சதபைப்பிப்புள்ள பகாதிகளில் வபேப்பம் மிகுதியாகவாம் வலியளேடு கபினமான தன்மயைள்ள பரெத்த வீக்கமாம் காணப்படும் தளேலின் நிறம் கரப்பாக இரூக்காம். இதன் காரணமாக மாடுகள் நடக்க மாபியாமல் நளெண்டும். நளேய் அறிகுறிகள் தளென்பட்டவாடன் மாட்டபை தனியாக பிரித்துத் ஒதுக்கூப்பறமாக வதைத்துக் கண்காணிக்க வணேடும். நளேய்க் கண்ட 24 மணி நரேத்திற்குள் உடனடியாக கால்நடளை மரூத்துவரின் உதவியாடன் மரூத்துவம் செய்ய வணேடும் இல்லயைலே மாடுகள் இறந்து விடும். ஒவ்வளெரா ஆண்டும் மழகைகாலத்திற்கு ஓர் மாதத்திற்கு மான்பளே மாடுகளூக்காத் தடப்பூசி பளேடுதல் அவசியம்.