



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சின்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	17/06/2023	மாதல்	21/06/2023
அறிக்கை எண் :	048/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	16/06/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரம்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39°-40° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலை 26° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (11.06.2023 மாதல் 15.06.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றறிவிப்பு -21-06-2023- 08.30 வரலை					
11/06	12/06	13/06	14/06	15/06	ததே	நாள்-1 17/06	நாள்-2 18/06	நாள்-3 19/06	நாள்-4 20/06	நாள்-5 21/06
0.0	0.0	8.6	4.3	0.0	மழை (மி.மீ)	3	6	8	8	6
40	40	40	39	40	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	41	40	39	39	39
26	27	26	26	27	காறந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
3	5	5	3	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	4	8	8	8	6
56	54	67	55	54	அதிக மற்றும் காறந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	70	70	80	70
43	49	46	39	43	காற்றின் வெகேம் (கி.மீ/மணி)	30	30	40	50	50
8	8	6	6	8	காற்றின் திசை	8	8	10	6	6
மறேகூ	வட மறேகூ	மறேகூ	மறேகூ	வட மறேகூ	காற்றின் திசை	மறேகூ	வட கிழக்கூ	தறேகூ	வட மறேகூ	தனென் மறேகூ

காறஞ்சயெத்தி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூன் 17, 18, 21 ததே லசோன மழயைம் மற்றும் 19, 20ம் ததே மிதமான மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலயைானது 39°-41° செல்சியஸ் ஆகவும், காறந்தபட்ச வெப்பநிலயைானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிககூ 6 மாதல் 10 கி.மீ வெகேத்தில், மறேகூ, வடகிழக்கூ, தறேகூ, வடமறேகூ மற்றும் தனென்மறேகூ திசகைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பபொது ஆலோசனலை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பூ வானிலைமான்றறிவிப்பு (16-22 ஜூன் 2023):
மழபைப்பபொழிவூ :

கொட்டகை கரசைல் இவற்றில் ஏதனும் ஒன்றினை தளெித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.

மிளகாய்:

மிளகாய் பயிரில் வரே அழுகல் நளேய் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்த நளேயகை கட்டுப்படுத்த, நடவூ செய்வதற்கூ இரண்டு வாரங்களுக்கு மூன்பு, வபேப் விதபைப் பபுபி @ 0.05கிராம்/கிலளே, வபேப்பிண்ணாக்கூ@ 0.15கிராம்/கிலளே மற்றும் பூதினா உரம் @ 0.75கிராம்/கிலளே ஆகியவற்றை கலந்து மண்ணில் இடவணேடும்.

மலேும், தபுகளேனசளேல் 0.1%, கார்பாக்சின் 0.25% மற்றும் காளளேரளேதலளேனில் 0.20% ஆகிய பூஞ்சகை ககல்லிகளளை கலந்து நடவூ செய்த 7 நாட்களில் மண்ணில் (நுனைப்பது) ஊற்றுவதன் மூலம் இந்நளேயகை திறம்பட கட்டுப்படுத்தமூபியம்.

கால்நடை:

தற்பளேது நிலவூம் பரவச்சூழலில் மாடுகளில் சப்பை நளேய்; தாக்கூதலூக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்நளேய் காற்றின் ஈரப்பதம் கூடூதலாகவூம் உள்ள பகூதிகளிலூள்ள மாடுகளபைப் பரூம்பாலூம் பாதிக்கிறது. இதுவூம் ஓர் மழகைகால நளேயாகூம். நல்ல ஆரளேக்கியமான திடமான இளம் மாடுகளளை 6 மாத வயது மூதல் 3 ஆண்டூ வயது வரளை அதிகம் பாதிக்கிறது. தடூடளை அல்லது மூன்கால் சப்பை அல்லது கழூத்து பளேன்ற சதபைப்பிப்பூள்ள பகூதிகளில் வபேப்பம் மிகூதியாகவூம் வலியளேடூ கபினமான தன்மயூள்ள பரூத்த வீக்கமூம் காணப்படூம் தளேலின் நிறம் கரூப்பாக இரூக்கூம். இதன் காரணமாக மாடுகள் நடக்க மூபியாமல் நளூண்டூம். நளேய் அறிகூறிகள் தனெப்பட்டவூடன் மூட்டபைப் தனியாக பிரித்துத் ஒதுக்கூப்பூறமாக வதைத்துக் கண்காணிக்க வணேடூம். நளேய்க் கண்ட 24 மணி நரேத்திற்கூள் உடனடியாக கால்நடளை மரூத்துவரின் உதவியூடன் மரூத்துவம் செய்ய வணேடூம் இல்லயைலே மாடுகள் இறந்து விடூம். ஒவ்வளூரூ ஆண்டூம் மழகைகாலத்திற்கூ ஓரூ மாதத்திற்கூ மூன்பு மாடுகளூக்கூத் தடூப்பூசி பளேடூதல் அவசியம்.