



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	35.0	35.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	82	84	85	85	83
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	26	31	31	36	41
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	146	139	119	124	144
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	1	1	2	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (84.0% & 33.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	89	88	89	88	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	25	36	34	36	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	234	205	120	96	114
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (88.0% & 34.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	89	88	90	89	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	25	35	34	36	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	230	203	117	93	110
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 33.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)



**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.



தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	36.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	86	87	86	84
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	26	34	33	36	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	195	162	109	104	122
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (86.0% & 34.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்க்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	89	90	89	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	25	36	34	36	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	229	202	108	83	100
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 34.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.





## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	85	86	86	83
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	30	30	33	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	6.0	5.0	5.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	161	140	112	113	116
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (85.0% & 31.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	24.0	24.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86	86	87	87	84
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	32	31	34	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	186	162	118	111	119
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (86.0% & 32.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	89	88	89	88	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	25	36	34	36	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	240	209	129	106	123
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (88.0% & 34.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)



**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



# கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -  
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	85	87	87	84
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	23	30	30	33	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	180	161	130	123	127
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	5	6

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (85.0% & 31.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	38.0	36.0	36.0	36.0	36.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	89	90	89	87
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	25	36	34	36	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	230	201	109	85	103
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	2	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (89.0% & 34.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.



தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொட்டியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	84	84	86	86	83
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	23	30	29	33	37
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	6.0	5.0	6.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	154	135	112	114	116
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (85.0% & 30.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 5.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	24.0	24.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	87	87	88	88	86
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	33	32	35	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	235	211	159	137	147
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	5	6

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (87.0% & 32.0%), 36.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.





## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	24.0	24.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	85	86	87	87	85
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	23	31	31	34	38
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	206	187	150	136	141
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	1	1	5	6

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (86.0% & 31.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.



## கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



## அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 14-03-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று  
வெளியிடப்பட்ட :2023-03-14 ( அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-03-15	2023-03-16	2023-03-17	2023-03-18	2023-03-19
மழையளவு (மி.மீ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை ( °செ )	37.0	36.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ )	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	85	85	86	86	83
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	26	33	32	36	39
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி )	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	171	148	111	112	129
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	1	1	1	6	7

### வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் மழை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (85.0% & 33.0%), 36.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 4.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும், அதிகபட்சமாக 8.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (15.03.2023 முதல் 21.03.2023 வரை) சராசரியை விட குறைவாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (5.29 மி.மீ. லிருந்து 0.75 மி.மீ.)

**குறுஞ்செய்தி :**

நிலவும் அதிக பகல் வெப்பநிலையால் கால்நடைகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும்.

**பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சோர்கம் ( ஜோவார் / சோளம் )	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக அசுவினியின் தாக்கம் சோளத்தில் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த டைமீத்தோயேட் 30 EC 500 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

**தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:**

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னை டானிக்: ஒரு வருடத்திற்கு இரண்டு பாக்கெட் (200 மி.லி.) டானிக்கை 6 மாத இடைவெளியில் வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். பயன்கள்: பச்சையம் அதிகரிக்கும், ஒளிச்சேர்க்கை திறன் கூடும், பாளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், குரும்பை கொட்டுதல் குறையும், காய்கள் பெரிதாகி பருப்பு எடை கூடும், விளைச்சல் 20 சதம் வரை அதிகரிக்கும் மற்றும் பூச்சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் முன்பருவ இலைக்கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ப்ரோபிகோனசோல் 25% EC 1 மி.லி/லிட்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 30 வது மற்றும் 50 வது நாட்களில் தெளிக்கவும்.
கத்திரிக்காய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக கத்திரியில் நாற்றமுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தேக்கத்தினை தடுக்கவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு 4 லிட்டர் என்ற வீதம் ஊற்றவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் மஞ்சள் இலைப்புள்ளி நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நோய்க்குட்பட்ட இலைகளை அகற்றி எரித்து விடவும் மற்றும் காப்பர் ஆக்ஸிகுளோரைடு மருந்தினை 2.5 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் நவம்பர் மாதம் முதல் மாத இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த கார்பென்டாசிம் 1 கிராம்/லிட்டர் என்ற அளவில் மூன்று தெளிப்புகள் தெளிக்கவும் மற்றும் அறிகுறிகள் தெரிந்ததிலிருந்து 15 நாட்கள் ஒருமுறை தெளிக்கவும்.
வெங்காயம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வெங்காயத்தில் கோழி கால் வேர் அழுகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த நடவு செய்த வயல்களில் ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடி-யை 2.5 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் தொழு உரத்துடன் கலந்து போடவும். அல்லது நடவு செய்வதற்கு முன்பு விதைகளை திரம் அல்லது கேப்டன் கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து நடவு செய்யவும்.

### உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது நிலவும் வெப்பநிலையில் கால்நடைகளை குளிப்பாட்டிய பிறகு காலை 11 மணிக்குள் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையினை மேற்கொள்ள வேண்டும். பால் கறக்கும் விலங்குகள் மற்றும் எருமைகளுக்கு அவற்றின் உடலில் தண்ணீர் தெளிக்கவும். கால்நடைகள் தானாக முன்வந்து குடிப்பதற்கு போதுமான குடிநீர் வைக்கவும்.

### கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சிக்கன்	வெப்பநிலை சற்று உயர்ந்து வருவதால் கோழிகளில் வெப்ப அயற்சி ஏற்படுவதை தவிர்க்க கோழி பண்ணைகளில் இரு ஓரங்களிலும் நனைந்த சாக்கை கட்டி விட வேண்டும்.

### பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற ( மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டம் உரமிடுதல் நல்ல பயனளிக்கும். பூக்கும் மற்றும் காய்க்கும் பருவத்தில் உள்ள காய்கறி பயிர்களுக்கு நுண்ணூட்டத்தை நீர் பாசனம் வழி விடுதல் அல்லது இலைவழியாக தெளிக்கவும்.