



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	3.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	38.0	37.0	37.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	67	67	67	74
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	27	36	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7	8	10	10	8
காற்றின் திசை (கோணம்)	236	242	246	269	265
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	6	5	7	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (69.0% & 31.0%), 37.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவ்ப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	60	60	60	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	7	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	202	244	247	272	267
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (66.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 26.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை



சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	60	60	60	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9	7	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	202	246	249	272	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (66.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 26.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.2 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவ்ப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	62	62	62	78
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	22	32	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	7	11	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	216	238	244	269	263
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (67.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	60	60	60	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9	6	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	200	249	249	270	269
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (66.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	63	63	63	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	23	31	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	220	240	255	276	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
நிலக்கடலை	நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	63	63	63	79
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	23	31	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	215	240	252	275	267
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	61	61	61	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	21	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	7	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	203	241	247	273	267
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (67.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 26.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவ்ப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	64	64	64	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	212	237	252	280	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவ்ப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை



சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	26.0	25.0	26.0	26.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	60	60	60	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	9	6	10	10	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	201	248	249	270	269
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (66.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 26.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொட்டியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	64	64	64	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	221	240	255	277	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	38.0	38.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	62	62	62	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	22	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	207	236	250	280	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (67.0% & 28.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை



சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	1.0	0.0	2.0	1.0	3.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	38.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	24.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	64	64	64	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	30	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7	8	10	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	209	235	251	282	268
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 8.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
சூரியகாந்தி	பூவின் அடிப்பாகத்திலுள்ள இழைகள் மற்றும் பின்புறம் மஞ்சள் நிறமடைந்து பூக்கொண்டையிலுள்ள விதைகள் கடினத்தன்மை அடைந்திருப்பது முதிர்ச்சிடைந்தமைக்கு அறிகுறியாகும். உலர்ந்த பூக்கொண்டைகளைப் பறித்து உலர்த்திய பின் விதைகளைத் தனியே பிரித்தெடுத்து சுத்தம் செய்யவேண்டும். அறுவடைக்குப் பின் விதை நேர்த்தி செய்து விதைகளை 8 முதல் 9 சத ஈரப்பதம் வரும் வரை நன்கு உலர வைக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நில தயாரிப்பு	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-05-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-05-23 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-05-24	2023-05-25	2023-05-26	2023-05-27	2023-05-28
மழையளவு (மி.மீ)	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39.0	38.0	38.0	37.0	37.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	26.0	25.0	25.0	25.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	64	64	64	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	24	33	30	30	30
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	7	8	11	10	9
காற்றின் திசை (கோணம்)	225	240	246	270	264
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	3	5	5	7	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 4 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (68.0% & 29.0%), 38.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 9.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

தமிழ்நாட்டில் மழை அளவானது இந்த வாரம் (24.05.2023 முதல் 30.05.2023 வரை) சராசரியை விட அதிகமாக பொழிய வாய்ப்புள்ளது (1.57 மி.மீ. லிருந்து 1.73 மி.மீ.)

குறுஞ்செய்தி :

நிலக்கடலையில் அசுவினி பூச்சியினை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு டைமீதோயேட் 30% EC மி.லி வீதம் 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	நெற்பயிரில் மாவுப்பூச்சியை கட்டுப்படுத்த மெத்தில் டீமெட்டான் 25% EC 1000 மி.லி/எக்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
பருத்தி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக பருத்தியில் இலை கருகல் நோய் ஏற்படக்கூடும். ஆரம்பத்திலேயே அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் மேங்கோசெப் 2 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் 2 அல்லது 3 முறை 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்கவும்.
மக்காச்சோளம்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மக்காச்சோளத்தில் அடிச்சாம்பல் நோய் ஏற்படக்கூடும். இதனை கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 1 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் நடவு செய்த 20 நாட்களுக்கு பிறகு தெளிக்கவும்.
சூரியகாந்தி	பூவின் அடிப்பாகத்திலுள்ள இழைகள் மற்றும் பின்புறம் மஞ்சள் நிறமடைந்து பூக்கொண்டையிலுள்ள விதைகள் கடினத்தன்மை அடைந்திருப்பது முதிர்ச்சிடைந்தமைக்கு அறிகுறியாகும். உலர்ந்த பூக்கொண்டைகளைப் பறித்து உலர்த்திய பின் விதைகளைத் தனியே பிரித்தெடுத்து சுத்தம் செய்யவேண்டும். அறுவடைக்குப் பின் விதை நேர்த்தி செய்து விதைகளை 8 முதல் 9 சத ஈரப்பதம் வரும் வரை நன்கு உலர வைக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈயின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
கத்திரிக்காய்	மே மாதம் கத்திரி சாகுபடி செய்வதற்கு முன்பு கத்திரி விதைகளை ட்ரைகோடெர்மா விரிடி கொண்டு 4 கிராம்/கிலோ என்ற அளவிற்கு விதை நேர்த்தி செய்து பயிரிடுவதால் பூஞ்சை நோய்கள் தாக்காமல் பாதுகாக்கலாம்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக வாழையில் குருத்து சுருட்டு அழுகல் நோயின் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும். எனவே இதனைக் கட்டுப்படுத்த மேங்கோசெப் 75% WP @ 1.5-2.0 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.

உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

உயிருள்ள விலங்குகள்	உயிருள்ள விலங்குகள் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பசு	தற்போது பொழிந்த மழையின் காரணமாக மாடு தொழுவத்தில் மற்றும் மாடு காட்டும் இடங்களில் ஈரம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் இதனால் மாடி நோய் வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே கட்டு தரைகளை உலர்வாகவும் சுண்ணாம்பு போன்ற கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நில தயாரிப்பு	அறுவடை முடிந்த நிலத்தினை உடனடியாக உழுவதன் மூலம் களைகளை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும், கோடைகாலத்தில் பெய்யும் மழைநீரை சேமிக்கலாம்.