
 <b>MSSRF</b> Science for Sustainable Development	<b>வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை</b> <b>இணைந்து வழங்குபவர்கள்</b> <b>பிராந்திய வானிலை மயம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை</b> <b>ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்</b> <b>ரெட்டியாரசத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்</b>						
	மாவட்டம் :	<b>தனே</b>	காலம் :	<b>18/10/2023</b>	மாதல்		<b>22/10/2023</b>
	அறிக்கை எண் :	<b>083/ 2023</b>	வெளியீட்டு நாள் :	<b>17/10/2023</b>			

### தனே மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32°-36° செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° - 25° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (12.10.2023 மாதல் 16.10.2023)					அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மாண்றிவிப்பு - 22-10-2023- 08.30 வரவை					
12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	தனே	நாள்-1 18/10	நாள்-2 19/10	நாள்-3 20/10	நாள்-4 21/10	நாள்-5 22/10
21.0	9.7	10.1	14.7	37.0	மழை (மி.மீ)	40	10	12	15	12
36	33	34	32	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	30	30	30	29	29
23	25	24	24	23	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	22	22	22	21	21
6	6	6	7	7	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6
95	88	89	89	95	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	94	94	94	92	92
69	69	68	72	73	காற்றின் வெகம் (கி.மீ/மணி)	80	80	80	76	76
6	1	4	4	3	காற்றின் திசை	5	5	5	4	4
நென் மழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு	நென் கிழக்க ு

### காறஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஓர் சில இடங்களில் அக்டோபர் 18 தனே சற்றே கன மழையும் மற்றும் 19, 20, 21, 22ம் தனேகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 29°-30° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 21°-22° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 5 மாதல் 6 கி.ப வெகத்தில், வெகிழக்க மற்றும் கிழக்க திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

### பொது ஆலோசனை:

மாவட்டத்தின் ஓர் சில பகுதிகளில் அக்டோபர் 18 தனே கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்கூட்டகை மற்றும் நீர்நிலைகளை சரிசெய்து மழைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளுமாறும் இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடதல் மற்றும் பூச்சிமரந்து தனெக்கம் வெகைகளை ஒத்த

தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடகளை மயேச்சலுக்கு வளியில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கட்டடகைகளில் கட்டி வகைக்கும்படியும் கட்டெுகொள்ளப் படுகிறார்கள்.

**எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கேற்ற வளோண் ஆலகேசனகைள்  
மாக்கிய பயிர்கள் :** பயறு வகை பயிர்கள், வளெங்காயம், கால்நடகை.

**பயறு வகை பயிர்கள்:**

தற்பகேது நிலவாம் பரவநிலகையில் பயறுவகைப் பயிர்களில் வகேர் அழுகல் நகேய் பரவலாக தளென்படுகின்றது. பாதிக்கப்பட்ட இலகைள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி, பழப்பூ நிறக்ககேடுகளை ஏற்படுத்தி பின் பழப்பூ நிறக்ககேடுகள் சகேர்ந்து, பகேரிய அழுகல் பகேன்ற தகேற்றத்தளை ஏற்படுத்தி இலகைள் மாதிர்வதற்கு மாண் உதிர்ந்து விடுகின்றன.

வகேர் மற்றும் வகேரின் அபிப்பாகத்தில் கரப்பூ நிறத் தகேற்றமாம், பட்டகைள் உரிந்துப் காணப்படுகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட சபெயின் வகேரை பிளந்து பார்த்தால், சிவப்பூ நிற தகேற்றமாம் உள்திசுக்கள் அழுகியாம் காணப்படும்.

இதனகைக் கட்டப்படுத்த 2.5 கிலகே சூடகேமகேனஸ் பூளூரகேசன்ஸ் அல்லது 2.5 கிலகே ட்ரகைக்ககேடர்மா விரிபி இவற்றூடன் 50 கிலகே மக்கிய தகேழூஉரம் அல்லது மணலூடகை கலந்து வயலில் இடலாம்.

மகேலும் 10 லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 25மிலி என்ற அளவில் அசாக்சிஸ்ட்ரகேபின் மரூந்தினகை கலந்து பாதிக்கப்பட்ட பயிரின் வகேர்பகாதியில் ஊற்றி கட்டப்படுத்தலாம்.

**வளெங்காயம்:**

வளெங்காயம் பயிரில் ஊதா ககேப்பூள நகேய் பரவலாக தளென்படுகின்றது. இதன் அறிகூறிகளை இலகைளில் மாதலில் வளெள்ளகை நிற நூண்ணிய பூள்ளிகள் தகேன்றி இலகையிளை நூனிப்பகாதியானது தகேமல் பகாதியாக மாறும்,

பின் இலகையின் அபிப்பூறத்திலிரூந்து மகேல்நகேக்கி பூள்ளிகள் உரூவாகும், இலகைள் மகேதூவாக நூனியிலிரூந்து கீழ்நகேக்கி மபிய ஆரம்பிககும்.

இதனகைத் தவிர்க்க நகேயற்ற வளெங்காய விதகைக் காமிழ்களை பயிரிடூவதற்கு தகேர்ந்தகேடூக் வகேண்டும்,

வயலகை நீர் வபியூமாறு வகைத்துக் ககேள்ள வகேண்டும்.

மகேலும் இதனகைக் கட்டப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 25கிராம் ககேப்பர் ஆக்ஸி கூளகேரகைட அல்லது 20 கிராம் கூளகேரகேதூலகேனில் இவகைளில் ஏதகேனும் ஒன்றகை கலந்து மூன்ற மூறகை இலகைவழித் தளெிப்பாக தளெிக்க வகேண்டும்.

**கால்நடகை:**

பரூம்பாலும் மழகைக்காலத்தில் தகேண்டகை அடபைப்பான் நகேய் தாககூதல் மிகூதியாக காணப்படும். இந்நகேயால் கறவகை மாடுகள் கூறிப்பாக எரூமகை மாடுகள், கலப்பினப் பசூக்களை அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன.

தொண்டை, மார்பு போன்ற பகுதிகளில் வீக்கம் ஏற்படும்.

இந்நோயிலிருந்து தங்களது கால்நடைகளை பாதுகாக்க, விவசாயிகள் அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவரை அணுகி மாடுகளுக்கு தடும்பூசி போடவேண்டும்.