



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	09/09/2023	மாதல்	13/09/2023
அறிக்கை எண் :	072/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	08/09/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 32°-36° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (03.09.2023 மாதல் 07.09.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு -13-09-2023- 08.30 வரவை					
03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	ததே	நாள்-1 09/09	நாள்-2 10/09	நாள்-3 11/09	நாள்-4 12/09	நாள்-5 13/09
5.6	7.6	0.0	0.0	0.0	மழை (மி.மீ)	0	3	4	2	2
36	35	34	32	35	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	34	33	33	33	32
24	26	26	25	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	24	23	23	22	22
6	7	6	6	7	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	8	7	7	5	8
86	92	66	95	78	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	70
64	57	54	56	56	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	12	10	6	8	10
தன் மறேக	மறேக	வட மறேக	தன் மறேக	மறேக	காற்றின் திசை	தன்மறேக	தன்மறேக	தன்மறேக	தன்மறேக	தன்மறேக

காறஞ்சயெதி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் செப்டம்பர் 10, 11, 12 மற்றும் 13ம் ததேகளில் லசோன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 32°-34° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 22°-24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிக்க 6 மாதல் 12 கி.மீ வகேத்தில், தன்மறேக திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கப்பட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு (08- 21 செப்டம்பர் 2023)

மழைப்பொழிவு :

08-09-2023 - 14-09-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தில் இயல்பை ஒட்டியே மழை பெய்ய வாய்ப்பு.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

08-09-2023 - 21-09-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது பொதுவாக இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 26° செல்சியஸ் முதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

08-09-2023 - 21-09-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் பொதுவாக இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 18° செல்சியஸ் முதல் 26° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கூ 6 முதல் 12 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரும்பு, வாழை, பப்பாளி, கசாய்யா, மூரங்கை போன்ற பயிர்களுக்கு மண் அனதைத்தல், மாட்டுகொடுத்தல், விட்டம் கட்டாதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேக்கொள்ளவும். கொடிகளை பயிர்களில் பந்தல்களில் தூர்பிடித்து பழுதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும் பொதுமான மாட்டுகளை கொடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிக்கவும் வலகைகளை ஒத்திவகைக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் சபெட்டம்பர் 9, 10ம் ததேதி இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனத முதல் மிதமான மழகைக் வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடகளை கிடகை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பொது பொதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்ககைகளை மறேக்கொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடகைகளை மயேச்சலுக்கு வளையே அணுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டககைகளில் கட்டி வகைக் கம்படியும் கட்டகொள்ளப் புகிறார்கள் இடி மின்னலில் இரந்து தங்கள் கால்நடகைகளை பாதுகாக்கப் பொருட்டு கழூத்தில் கட்டியுள்ள உலகை மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளோண் ஆலகைசனகைகள்

மாக்கிய பயிர்கள் : வாழகை, மா, கால்நடகை

வாழகை:

வாழகையில் கிழங்கு துளகைக் கும் கூண் வண்டு தாக்குதல் பரவலாக தனென்புகிறது. இவ்வண்டு இளம் மற்றும் வளர்ந்த மரங்களகைத் தாக்கி பொருளாதார சதேத்தகை ஏற்புத்தும்.

பாதிக்கப்பட்ட வாழகையின் இலகைகள் மஞ்சள் நிறமாகி, வளர்ச்சி கூன்றி, வரேர் பாதிக்கப்பட்ட, மகசூல் கூறகையம்.

நடுவதற்கு மூன்னால் ஒரு கூழிக்கு 250 கிராம் ஆமணக்கு பாண்ணாக்கு இடுவதால் இப்பூச்சியின் தாக்குதலகை தடக்கலாம்.

60-100கிராம் வபேப்பங்கொட்டபைப் பொடி அல்லது வபேப்பம் பாண்ணாக்கினகை கிழங்குகளை நடும்புதும் பின்பு 4 மாதங்கள் கழித்து ஒரு மூறகையம் இடுவதால் பூச்சித் தாக்குதல் கூறகைவதகை, நல்ல மகசூல் பெறலாம்

பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்ககைகளை மழகை இல்லாத நாட்களில் மறேக்கொள்ளவும்.

மா பயிரில் சாம்பல் கரகல் நோய் தாக்காதல் தனென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இந்நோய் தாக்காதலினால் இலகைகளில் நுனி, விளிம்பில் பழப்பு நிறப் பள்ளிகள் தோன்றி பின் அடர் பழப்பு நிறமாகி கறுப்பு நிறப் பள்ளிகளை உரவாக்குகிறது. அதிக ஈரப்பதம் இரக்கம் போது அதிகமாக நோய்த் தாக்கம் காணப்படும்.

பாதிக்கப்பட்ட சடெயின் பகூதிகளை சகேரித்து அழிக்க வணெடும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த 10 லிட்டர் தண்ணீரக்கு 250கிராம் காப்பர் ஆக்சிகளோரடை மற்றும் 25மில்லி அசாக்சிஸ்ட்ராபின் உடன் 10மில்லி ஒட்டுப்பசை கலந்து தளெிக்கவாம்

பயிர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மழை இல்லாத நாட்களில் மறேகொள்ளவாம்.

கால்நடை:

நிலவாம் பரவச் சூழ்நிலையின் காரணமாக தங்களது வளெள்ளாடு மற்றும் சடெம்மறி ஆடுகளை வளெிப்புற ஒட்டுண்ணிகள் தாக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

இவ்வகை பூச்சிகள் இரப்பதற்கான அறிகூறிகள் தனெபட்டால் வளெிப்புற ஒட்டுண்ணிகளிடம் இரந்து தங்களது கால்நடைகளைப் பாதுகாக்க ஒரு லிட்டர் தண்ணீரக்கு 2மில்லி என்ற அளவில் பூட்டாக்ஸ் மரூந்தினை கலந்து ஆடுகளின் வளெிப்புற உடலில் மட்டும் பூச வணெடும்.

கண்டிப்பாக இந்த மரூந்தை உட்புறத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது.