



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை
இணைந்து வழங்குபவர்கள்
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	சிவகங்கை	காலம் :	30/09/2023	மாதல்	04/10/2023
அறிக்கை எண் :	078/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	29/09/2023		

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (24.09.2023 மாதல் 28.09.2023)					அடத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்றறிவிப்பு -04-10-2023- 08.30 வரல					
24/09	25/09	26/09	27/09	28/09	ததே	நாள்-1 30/09	நாள்-2 01/10	நாள்-3 02/10	நாள்-4 03/10	நாள்-5 04/10
3.6	0.4	0.0	4.9	2.9	மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	4
38	37	35	36	38	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	36	36	35	35	35
25	26	25	24	25	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	26	25	25	24
4	5	6	4	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	8	7
70	68	64	68	59	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	80	70
41	50	49	84	48	காற்றின் வெகேம் (கி.மீ/மணி)	14	16	16	14	14
6	6	4	7	10	காற்றின் திசை	தென்ம றேக	தென்ம றேக	தென்ம றேக	தென்ம றேக	தென்ம றேக
தென் மறேக	மறேக	வட மறேக	வட மறேக	வட மறேக						

காறஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஓர் சில இடங்களில் அக்டோபர் 4ம் ததே லசோன மழகைக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 35°-36° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக் 14 மாதல் 16 கி.மீ வெகேத்தில், தென்மறேக திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

அடத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பு வானிலைமான்றறிவிப்பு (29 செப்- 1 அக்டோபர் 2023):

மழைப்பொழிவு :

மாவட்டத்தில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட கௌதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

29-09-2023 - 12-10-2023: மாவட்டத்தில் காறறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

மாவட்டத்தின் ஓரிரா இடங்களில் சபெட்டம்பர் 30 மற்றும் அக்டோபர் 1ம் ததேதி இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது மாதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளான கிடலை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பதேது பதேதிய பாதாகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேக்கொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் காலநடகைகளை மயேச்சலுக்கு வளையே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதாகாப்பாக கட்டககைகளில் கட்டி வகைக்கம்படியும் கட்டேக்கொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இரந்து தங்கள் காலநடகைகளை பாதாகாகும் பொரூட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலகேக மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

மகேமூட்டத்தூடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுபொறி வதைத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுபொறி அட்டலை வதைத்து அசுவினி மற்றும் இலதைதுளபைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

அடூத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கூ 14 மாதல் 16 கி.மீ. வகேத்தில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரம்பு, வாழை, பப்பாளி, கடிய்யா, மூரங்களை பதேன்ற பயிர்களுக்கு மண் அனதைத்தல், மூட்டுகொடூத்தல், விட்டம் கட்டூதல் பதேன்ற பாதாகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேக்கொள்ளவும். கட்டிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் தூரூபிபித்து பழூதடநைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும் பதேதுமான மூட்டுகளை கட்டூக்கவும். பயிர்களுக்கு மரூந்து தளிக்கூம் வலேகைகளை ஒத்திவகைக்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளேண் ஆலசேனகைள்
மூக்கிய பயிர்கள் : பரூத்தி, டூடலை, காலநடலை

பரூத்தி:

தறூபதேது பெய்துள்ள மழையை பயன்படூத்தி மானாவாரியில் பரூத்தி பயிரிடும் விவசாயிகள் நடவூசயெத்த 10 நாட்களில் ஏக்கரூக்கு 5 கிலகே பரூத்தி நூண்ணூட்டம் அல்லது 20 கிலகே மகெனீசியம் சல்பட்டே உரத்தினலை கட்டூத்து நூண்ணூட்டசத்து காறபாட்டினலை நிவர்த்தி செய்யலாம்.

மலேும் மக்கிய தடூழூஉரத்தூடன் ஏக்கரூக்கு 2 கிலகே அசகேஸ்பரையில்லம் மற்றும் 2 கிலகே பாஸ்பகே பாக்டீரியாவகை கலந்து இட்டூ சிறந்த பயிர் வளர்ச்சியூடன் நல்ல

புடலலை:

பந்தல்வகை காய்கறிப் பயிர்களான புடலலை, பீர்க்கன், பாகல் ஆகியவற்றில் ஆண் பூக்களின் எண்ணிக்கை காரைத்து பண்ணை பூக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக்காவது மகசூல் அதிகரிக்க உதவும்

புடலலை மற்றும் பாகல் காய்க்கு 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 1 மில்லி எத்ரல்(100 பிபிஎம்) என்ற விகிதத்திலும்,

பீர்க்கன்காய்க்கு 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 2.5 மில்லி எத்ரல்(250 பிபிஎம்) என்ற விகிதத்திலும் கலந்து மாதல் இரண்டு இலகைள் உரவாகிய பின் ஒருமூறையாம், பின்பு ஒரு வார இடவைளெளியில் 4 மூறகை தளெளக்க வணெண்டும்.

கால்நடலை:

தற்புது மாட்டாக்கொட்டககைளில் ககொசுக்கள் அதிகமாக காணப்ப்டும். இவற்றில் பண்ணை ககொசுக்கள் மாட்டயைடுவதற்காக மாடகளை கடித்து இரத்தத்தகை உறெஞ்சுகிறது. மலும் அதிக இரத்த இழப்பால் கால்நடகைள் உடல் எடகை இழப்பு மற்றும் பால் உற்பத்தி காரகை வாய்ப்புள்ளது சில நரேங்களில் கால்நடகைள் இறந்து விடவும் கூடும். ககொசுக்களைக் கட்டப்ப்டுத்த மாதலில் நீர்த் தகேக்கங்கள் ஏதும் அரகில் இரப்பின் அதனை நீக்கி சூத்தம் சயெய் வணெண்டும். வபேபிலகை மற்றும் சாம்பிராணி ககொண்டு பாககைமூட்டுதல், ககொசு மரூந்தகை காற்றில் நீர்த்திவலகைளாக தளெளப்பது பபுன்ற சயெல்களின் மூலமாக ககொசுகளை அழிக்கலாம். இரப்பினும் இது ஒரு தற்காலிக தீர்வயுாகும்.