



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்

கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 16-04-2024

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-04-16 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-04-17	2024-04-18	2024-04-19	2024-04-20	2024-04-21
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	6.0	34.0	14.0	9.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	24.0	23.0	23.0	22.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	13.0	13.0	12.0	11.0	11.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	80	90	80	90	80
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	40	40	50	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	4	4	4	4	6
காற்றின் திசை (கோணம்)	200	200	160	200	90
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	5	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் இருந்து மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். முதல் நாள் மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை எனவும், 2-வது நாளாக லேசான மழையும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 22- 25°செஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 11-13°செஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80-90 சதவிகிதமாகவும். மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 30-50 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும்.சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 04-06 கி.மீஅளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

மூன்றாவது நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விதைகளை ட்ரைக்கோடெர்மா விரிடு @ 4 கிராம்/ கிலோ அல்லது பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் @ 10 கிராம்/கிலோ கொண்டு விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்க்கிருமிகளை கட்டுப்பாடுத்த விதை நேர்த்தி

செய்யலாம். மேலும், எந்தவொரு பயிர் திட்டத்திற்கும் முன்பு மண் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும். மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

குறுஞ்செய்தி :

பாகற்காயில் அசுவினி மற்றும் தத்துப்பூச்சி நிர்வகிக்க, இமிடாக்ளோபிரிட் 70 WG 1.0g/10lit இலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
செங்கிழங்கு	பீட்ரூட் பயிரில் இலைப்புள்ளி நோயை கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில் மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி இலைகளில் தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
முள்ளங்கி	கேரட்டில் நூற்புழு மேலாண்மைக்கு, நடவு செய்யும் போது எக்டருக்கு 1 டன் வேப்பம் பிண்ணாக்கு மண்ணில் இடவும். கடுகு செடிகளை உயிரி புகையாக்குதல் மற்றும் வேப்பம் பிண்ணாக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு 250 கிலோ இடுதல், பர்ப்யூரோசிலியம் லிலாசினம் @ 5 கிலோ/எக்டருக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
உருளைக்கிழங்கு	உருளைக்கிழங்கு பயிரில் ஏற்படும் இலை கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45, 60 மற்றும் 75 நாட்களில், ஹெக்ஸ்கோனசோல் 2% எஸ்சி @ 0.06% அல்லது மான்கோசெப் @ 2 கிராம்/லி ஆர்க்ளோரோதலோனில் @ 2 கிராம்/லி ஆகியவற்றை இலைவழி தெளிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
தேயிலை	தேயிலை பயிரில் சிலந்திப் பூச்சியை கட்டுப்படுத்த, அசாடிராக்டின் 1.0% இசி (வேம்பு அடிப்படையிலானது) 2.0 மிலி/லிட் அல்லது புரோபார்கைட்டு 57% இசி 2.0 மிலி/லிட் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.