



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 17-12-2024

தி -நீல்கிரிஸ்(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-12-17 (
அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-12-18	2024-12-19	2024-12-20	2024-12-21	2024-12-22
மழையளவு (மி.மீ)	3.0	5.0	10.0	5.0	10.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	45	45
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	60	60	55	55
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	3	3	3	2	2
காற்றின் திசை (கோணம்)	280	280	280	250	250
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	6	6

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருந்து பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் இருக்கும். அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 22- 23 °செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 8 ° செ ஆகவும் இருக்கக்கூடும். காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 45-50 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 55-60 சதவிகிதமாகவும் இருக்கக்கூடும். சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 02-03 கி.மீ அளவுக்கு வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

விதை மூலம் பரவும் நோய்களை நிர்வகித்தல் விதைகளை டிரைக்கோடெர்மா அஸ்பெரெல்லம் @ 4 கிராம்/கிலோ அல்லது பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ் @ 10 கிராம்/ கிலோகொண்டு விதை மூலம் பரவும் நோய்க் கிருமிகளை கட்டுப்படுத்த விதை நேர்த்தி செய்யலாம். மேலும், எந்தவொரு பயிர் திட்டத்திற்கும் முன்பு மண்பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.

குறுஞ்செய்தி :

உருளைக்கிழங்கு பயிரில் இலை சுருகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த, நடவு செய்த 45,60 & 75 நாட்களில் மான்கோசெப்@2கி/லி அல்லது குளோரோதலோனில்@2 கிராம்/லி என்ற அளவில் இலைவழி, மழை இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
முள்ளங்கி	கேரட் பயிரில் துரு ஈ மேலாண்மை விதைத்த 45 - 50 நாட்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு 4 கிலோ குளோரோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் என்ற குருணை மருந்துகளை, மழை இல்லாத நேர மண்ணில் இடவேண்டும்.

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
முள்ளங்கி	கேரட்டில் நூற்புழு மேலாண்மைக்கு, நடவு செய்யும் போது எக்டருக்கு 1 டன் வேப்பி புண்ணாக்கு மண்ணில் இடவும். கடுகு செடிகளை உயிரிபுகையாக்குதல் மற்றும் வேப்பம்புண்ணாக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு 250 கிலோ இடுதல், பர்ப்பூரோசிலியம்லில் @ 5 கிலோ/எக்டர் என்ற அளவில், மழை இல்லாத நேரங்களில் இட வேண்டும்.
தேயிலை	தேயிலையில் கொப்புள கருகல் நோய் மேலாண்மை முறைகள் • பாதிக்கப்பட்ட இ மற்றும் தளிர்களை கவாத்து மூலம் நீக்கி அழிக்கவும் • ஹெக்ஸ்கோனசோல் @ 200 மி/காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 210 கிராம்/எக்டருக்கு 5 நாட்கள் இடைவெளியில் (அல்லது) காப்பர்ஆக்ஸிகுளோரைடு @ 210 கிராம் + புரோபிகோனசோல் @ 200 மி/எக்டருக்கு 5 நாட்கள் இடைவெளியில், குறிப்பாக – நவம்பர் மாதங்களில் தெளிக்கவும் • எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய ரகங்களை தவிர்த்து, நோய் எதிர்ப்பு ரகங்களை யிரிடவும் மத்திய பூச்சிக்கொல்லி வாரியப் பரிந்துரைகள் • பின் வரும் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றை தெளிக்கவும். • ஹெக்ஸ்கோனசோல் 5% EC @ 200ml/ha (அல்லது) • புரோபிகோனசோல் 5% EC @ 125-250ml/ha (அல்லது) • கார்பென்டாசிம் 12%+ மான்கோசெப் 63% WP @ 1250g/ha (அல்லது) • ஹெக்ஸ்கோனசோல் 4% + ஜினெப் 68% WP @ 625g/ha
மிளகாய்	காய்கறி பயிர்களை தாக்கும் நச்சுயிரி நோய்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த நோய் மேலாண்மை முறைகள் • நோயற்ற விதைகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் • ஒரே திரும்ப திரும்ப பயிரிடக் கூடாது • நச்சுயிரி தாக்கப்பட்ட செடிகளை சேகரித்து, அழிக்க வேண்டும் • நாற்றங்கால் படுக்கைகளின் மீது நைலான்வலை (அ) வைக்கோல் கெட்டி மூட வேண்டும் • மிளகாய் போன்ற காய்கறி பயிர்களை பயிரிடும்போது, 2-3 வரிசை மக்காச்சோளம் (அ) சோளத்தை வரப்பு பயிராக பயிரிட வேண்டும் • ஒட்டுப்பொறி (நீலம் & மஞ்சள், முறையே) ஏக்கருக்கு 5 என்ற எண்ணிக்கையில் வயலில் பொருத்த தேவையெனில், டைமெத்தோயேட் @ 2.0 மி/லிட்டர் (அ) தையாமீதக்ஸம் @ 0.2 மி/லிட்டர் (அ) இமிடாக்ளோப்ரிட் @ 0.2 மி/லிட்டர் என்ற அளவில் கைத் தெளிப்பான் கொண்டு இல்லாத நேரங்களில் தெளிக்கவேண்டும்.