



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 23-01-2024

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2024-01-23 (
அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2024-01-24	2024-01-25	2024-01-26	2024-01-27	2024-01-28
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	31.0	32.0	32.0	32.0	32.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90	90	90	90	90
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	50	50	50	40	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	10	10	12	18	16
காற்றின் திசை (கோணம்)	70	50	50	50	50
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	0	3	0	1	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31.0°C - 32.0°C வேறுபாட்டிலும் எனும் , குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21.0°C - 22.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு ஓரளவு மேகமூட்டமான வானம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்றின் வேகம் மணிக்கு 10 - 18 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

தற்போது வளர் நிலையில் உள்ள அனைத்து விதமான பயிர்களுக்கும் ஊட்டச்சத்திற்காக நேனோ யூரியா கொண்டு ஒவ்வொரு பயிர்க்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு நேனோ யூரியா தெளிக்க வேண்டும்.

குறுஞ்செய்தி :

கால்நடைகளுக்கு தேவையான பசுந்தீவனத்தை வருகின்ற கோடை காலத்தில் பயன் படுத்த ஊறுகாய் புல்லாக மாற்றி சேமித்துவைக்க வேண்டும்.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நிலக்கடலை	தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காரணமாக கார்த்திகை பட்டத்தில் விதைத்த நிலக்கடலை பயிரில் அசுவினி தாக்க வாய்ப்பு உள்ளது . விவசாயிகள் வயலை நன்கு கண்காணித்து தாக்குதல் காணப்பட்டால் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
சேவல்	<p>ஜனவரி மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் இரவு வெப்பம் குறைந்தும், பகல் வெப்பம் சற்று உயர்ந்தும் காணப்பட்டுத் தும், பின் பனிக்காலமாக நிலவும். பின்பனிக்காலத்தில் வெப்ப அளவுகள் உயர்வத் தும், குறைவத் தும் மாறி மாறி காணப்படுவது இயல்பே. இவ்வானிலையில், கோழிகள் மற்றும் கறவை மாடுகள் அயற்சியினால் பாதிக்கப்படுவத் தும் இயல்பே. கோழிகளில் அதிக தீவன எடுப்பு, முட்டை ட் உற்பத்தி குறைபாடு ஆகியவையையும், மாடுகளில் பால் உற்பத்தி குறைந்து, கொழுப்பு குறைவத் தும் காணப்படும். கோழிகளுக்கான தீவனத்தில் தாவர எண்ணெய் டன்னிற்கு 5 கிலோ சேர்ப்ப் தும் கறவை மாடுகளின் கொட்டட் கையை குளிர்ந்த் ந்த காற்றின் பாதிப்பு இல்லாமல் படுதாவை கொண்டு தடுக்க வேண்டும்.</p>

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	<p>தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் வேளாண் பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள விவசாயிகள் பாசன நீர் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் வேளாண் பயிர்கள் வறட்சி தங்கி வளர ஏக்கருக்கு 200 மி.லி மித்தைலோ பாக்கிரியம் கரைசல் அல்லது 0.5 % பொட்டாசியம் குளோரைடு கரைசலைக் கொண்டு 15-20 தெளிப்பு செய்ய வேண்டும்.</p>