

நோய்களின் பெயர்

**குலை நோய்
(பைரிகுவேரியா கிரைஸ்தீய)**

கட்டுப்படுத்தும் முறை

- கீழ்கண்ட ஏதேனும் ஒரு பூசணக் கொல்லியைத் ஒரு ஹெக்டேர் தெளிக்கவும் ஏடிபென்பாஸ் 500 மிலி (அ) கார்பென்டசின் 250 கி (அ) ஐ.பி.பி 500 மிலி. முதல் தெளிப்பு நோய் அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் தெளிக்க வேண்டும்.
- இரண்டாவது, மூன்றாவது தெளிப்புகள் கதிர் வெளிவரும்போது 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்க வேண்டும். இவைகள் கதிர் மற்றும் விரல் குலை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்.
- சூடோமோனாஸ் புளோரசன்ஸ் (10 கிராம் , கிலோ) யை கொண்டு விடை நேர்த்தி செய்யவும். பின்பு பயிரில் சீஸை கருவேல் இலைச்சாறு (புரோசோ பிஸ் ஜீலிபுளோரா) 10 சதம் மற்றும் நெய்வேலி காட்டாமணக்கு இலைச்சாறு 10 சதம் கொண்டு தெளிக்கவும்.
- ஆரியோபனஜின்-சால் 100 பிபிம் மருந்தினை 50 சதம் கதிர் வெளிவரும்போது தெளிக்கவேண்டும். இரண்டாவதாக மேன்கோசெப் 1000 கிராம் (ஹெக்டருக்கு) மருந்தினை 10 நாட்கள் இடைவெளியில் தெளிக்க வேண்டும்.
- பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை பிடிங்கி அப்புறப்படுத்துதல்
- மோனோக்ரோட்டோபாஸ் (36 டிபுள்யூ எஸ்.சி) 700 மிலி (அ)
- மீதைல் டெமட்டான் (25 இசி) 500 மி.லி (ஒரு ஹெக்டெருக்கு) நோய் அறிகுறிகள் தெரிந்தவுடன் தெளிக்க வேண்டும். மறுபடியும் தேவையானால் 20 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு தடவை தெளிக்க வேண்டும்.

தேவை நோய்

**கேழ்வரகு பச்சை
கலந்த மஞ்சள் கோடு நோய்
(ரேப்டோ வைரஸ்)
நோய் பரப்பும் காரணி
தத்துப்புச்சி (சிக்குடுவினா
ஸ்பாந்டெட்டா)**