

**ஆ. நோய் மேலாண்மை**

<p><b>விதை நேர்த்தி</b></p>	<p>டால்கம் பவுடர் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட டிரைக்கோடெர்மா விரிடியை 4 கிராம், ஒரு கிலோ விதைக்கு) (அ) சூடோமோனாஸ் ப்ளுரசன்ஸ் (10 கிராம் , ஒரு கிலோ விதைக்கு) (அ) கார்பன்டாசிம் (அ) திரம் (2 கிராம், ஒரு கிலோ விதைக்கு) என்ற விகிதத்தில் கலந்து விதைத்தல் வேண்டும்.</p>
-----------------------------	--

<p><b>நோய்களின் பெயர்</b></p>	<p><b>கட்டுப்படுத்தும் முறை</b></p>
<p><b>வாடல் நோய்</b> ப்ரூசேரியம் ஆக்ஸிஸ்போரம் வகை சிசரி</p>	<p>சூடோமோனாஸ் ஃபுளுரசன்ஸ் 2.5 கிலோ , ஒரு ஹெக்டேர் என்ற விகிதத்தில் மண்ணிற்கு இடுதல்.</p>
<p><b>வேரழுகல் நோய்</b> மேக்ரோஃபோமினா பேசியோலினா (ரைசுக்டோனியா பட்டாடிகோலா)</p>	<p><b>உயிரியல் முறை கட்டுப்பாடு</b> சூடோமோனாஸ் ஃபுளுரசன்ஸ் ஒரு ஹெக்டேருக்கு (அ) டிரைக்கோடெர்மா விரிடியை (2.5 கிலோ) இதனை 50 கிலோ மக்கிய தொழு உரம் அல்லது மணலுடன் கலந்து விதைத்த 30 நாட்களுக்கு பிறகு மண்ணில் இடவேண்டும். <b>இரசாயன முறை</b> கார்பன்டாசிம் ஒரு கிராம் மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து பாதிக்கப்பட்ட இட்களில் வேர்பாகம் நன்கு நனையும்படி ஊற்ற வேண்டும்.</p>